

Uganda

Agosto 2026



Introducción

Nuestro tour ornitológico de 14 días por Uganda comenzó el 9 de agosto y finalizó el 22 de agosto, después de dos semanas intensas recorriendo algunos de los lugares más espectaculares del país. Un viaje extraordinariamente completo que nos permitió descubrir la enorme diversidad de hábitats de Uganda y disfrutar de una combinación excepcional de aves, grandes mamíferos y algunos de los paisajes más impresionantes de África.

A lo largo del recorrido visitamos los principales parques nacionales del país, además de numerosos enclaves estratégicos de gran interés ornitológico. Las extensas sabanas de Murchison Falls, Queen Elizabeth y Lake Mburo nos ofrecieron algunos de los safaris más memorables del viaje. Allí, además de disfrutar de los grandes mamíferos africanos, pudimos observar una extraordinaria variedad de aves, entre ellas nada menos que 33 especies de rapaces diurnas, con especies tan destacadas como el **Bat Hawk** y la imponente **Martial Eagle**. A ellas se sumaron **8 especies de cucos**, **5 de turacos** y hasta **9 especies diferentes de abejarucos**, aportando color y diversidad a prácticamente cada jornada.

Los grandes lagos, humedales y cursos fluviales fueron otro de los grandes protagonistas del viaje. Lugares tan emblemáticos como el lago Victoria o el canal de Kazinga nos permitieron sumar multitud de especies acuáticas y asociadas a estos ambientes, incluyendo nada menos que **8 especies de martines pescadores**, **7 especies de avefrías** y, como no, el **Shoebill** junto a un pequeño pollo.

Pero Uganda es mucho más que sus sabanas y humedales. Uno de los momentos

ornitológicos más esperados llegó en los increíbles bosques de Kibale, donde conseguimos observar una de las aves más deseadas de todo el viaje: el espectacular **Green-breasted Pitta**. Más adelante nos adentramos en los bosques de montaña del Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi, uno de los lugares más extraordinarios de África. Allí vivimos una de esas experiencias difíciles de olvidar: compartir una hora con los **gorilas de montaña**, observándolos a muy corta distancia en el interior de su hábitat natural. Bwindi también nos reservó grandes momentos ornitológicos, entre ellos el encuentro con otro de nuestros grandes objetivos y una de las aves más codiciadas del continente: el **Grauer's Broadbill**.

Esta extraordinaria combinación de sabanas, bosques tropicales, selvas de montaña, lagos, ríos y humedales convirtió cada jornada en una experiencia diferente. Fueron 14 días repletos de observaciones espectaculares, encuentros inolvidables con la fauna africana y multitud de anécdotas compartidas por todo el grupo.

Y el resultado final estuvo a la altura del viaje: **más de 450 especies de aves observadas en tan solo dos semanas**, además de una magnífica selección de mamíferos y algunos encuentros con la naturaleza que permanecerán para siempre en nuestra memoria. Las tres especies más valorados por los 9 participantes fueron en primer lugar el **Shoebill**, luego **African Fish Eagle** y finalmente, **Abyssinian Ground Hornbill**.

¡Uganda volvió a demostrar por qué es conocida como la Perla de África y por qué es uno de los grandes destinos ornitológicos del continente!



Grupo al completo tras observar la Green-breasted Pitta en los bosques de Kibale, junto a la guardería del parque nacional.

Día 1 – Llegada a Entebbe y desplazamiento hasta Tilapia Lodge

Nuestra llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe fue a primera hora de la tarde y, nada más salir de la terminal, ya nos estaban esperando nuestros dos guías junto a los dos vehículos 4x4. ¡La aventura en Uganda comenzaba de inmediato! En poco más de 15 minutos estábamos subiendo a las embarcaciones para cruzar un pequeño tramo del lago Victoria y llegar al Tilapia Lodge, donde pasaríamos nuestras dos primeras noches.

Y, como no podía ser de otra manera en Uganda, las primeras aves no tardaron en aparecer. Durante el corto trayecto hasta el lodge ya pudimos observar **African Openbill, Yellow-billed Stork**, varios **Reed**

Cormorant, Hamerkop, Pied Kingfisher, hasta tres **Gray-backed Fiscal, Piapiac, Rüppell's Starling, African Thrush** y **Northern Gray-headed Sparrow**. ¡Una magnífica bienvenida para nuestros primeros minutos en el país!

Una vez instalados en nuestro agradable lodge, la actividad de aves a orillas del lago Victoria hizo crecer rápidamente nuestra lista. Prácticamente sin movernos de los alrededores del alojamiento fuimos sumando **Egyptian Goose, Red-eyed Dove, Eastern Plantain-eater, Spur-winged Lapwing, African Jacana, Hadada Ibis, Shikra, Woodland Kingfisher, Gray Parrot, Black-headed Gonolek, Swamp Flycatcher,**

Slender-billed Weaver, Northern Brown-throated Weaver, Bronze Mannikin y African Pied Wagtail, entre muchas otras especies.

Con la llegada de la noche pusimos punto final a esta primera y breve toma de

contacto con Uganda. Después de cenar en el lodge, repasamos juntos la lista de aves observadas durante la jornada y nos fuimos a descansar tras el largo viaje, con muchas ganas de comenzar, a la mañana siguiente, nuestra primera jornada completa de birding en tierras ugandesas.



Gray Parrot y African Openbill desde Tilapia Lodge ©Ferran López



La primera cena en Tilapia Lodge ©Ferran López

Día 2 – Jardín Botánico de Entebbe y Mabamba Swamp

Iniciamos nuestra segunda jornada levantándonos muy temprano y, después de desayunar en nuestro lodge, ya pudimos observar algunas especies interesantes por los alrededores, como tres **Yellow-billed Duck**, **African Openbill**, **Little Heron**, **Palm-nut Vulture**, **Black Kite** (de pico amarillo), **Malachite Kingfisher**, dos **Gray Parrot** observados a corta distancia, **Red-chested Sunbird**, **Northern Brown-throated Weaver** y **Black-headed Weaver**.

Tras cruzar un pequeño tramo del lago Victoria, continuamos nuestro recorrido a bordo de nuestros dos vehículos en dirección al Jardín Botánico de Entebbe. Durante el trayecto conseguimos observar al menos dos **Meyer's Parrot**, además de otras especies más comunes.

Una vez llegamos a este espectacular jardín botánico, dedicamos buena parte de la mañana a recorrer prácticamente todo su perímetro, disfrutando de un auténtico festival ornitológico que nos permitió registrar nada menos que **68 especies de aves**. La diversidad fue extraordinaria y las observaciones se sucedieron prácticamente sin descanso.

Entre las numerosas especies que conseguimos observar destacaron **African Green-Pigeon**, hasta seis **Great Blue Turaco**, **Eastern Plantain-eater**, **Ross's Turaco**, **Klaas's Cuckoo**, **Black Cuckoo**, **Marabou Stork**, **Black-headed Heron**, **Pink-backed Pelican**, **African Harrier-Hawk**, dos **Hooded Vulture**, **Wahlberg's Eagle** y una de las observaciones más interesantes de la jornada: dos **Bat Hawk** que estaban construyendo un nido. También pudimos disfrutar de **Gabar Goshawk**, **Lizard Buzzard**, dos **Crowned Hornbill**, **Black-and-white-casqued Hornbill**, **African Pygmy**

Kingfisher, hasta tres **Woodland Kingfisher**, **Broad-billed Roller**, **Yellow-fronted Tinkerbird**, dos **African Gray Woodpecker** y **African Hobby**.

La lista continuó creciendo con dos **Black-and-white Shrike-flycatcher**, **Northern Puffback**, **Green-backed Camaroptera**, dos **Tawny-flanked Prinia**, **Gray-capped Warbler**, **Pale-throated Bulbul**, **Little Bulbul**, **Green Hylia**, **Green White-eye**, **Splendid Starling**, **African Thrush**, **Northern Black-Flycatcher** y un espectacular **Snowy-crowned Robin-Chat**, que nos regaló una de las observaciones más bonitas de la mañana.

Los suimangas y los tejedores también tuvieron un protagonismo especial, con especies tan atractivas como **Green-headed Sunbird**, **Olive Sunbird**, **Scarlet-chested Sunbird**, **Olive-bellied Sunbird**, dos **Superb Sunbird**, al menos dos **Orange Weaver**, **Black-necked Weaver** y **Black-headed Weaver**. Completamos esta magnífica selección con **Bronze Mannikin**, **Black-and-white Mannikin** y **Red-billed Firefinch**, entre muchas otras especies.

Después de semejante atracón de aves, regresamos a nuestro alojamiento para almorzar y descansar un poco. Sin embargo, la actividad ornitológica no se detuvo ni siquiera durante este momento de relax, ya que todavía conseguimos añadir nuevas especies a nuestra lista, entre ellas dos **African Blue Flycatcher**, **Speckled Pigeon**, **Brown-throated Wattle-eye**, **Yellow-breasted Apalis**, **White-headed Sawwing**, **Red-cheeked Cordon-bleu** y un espectacular **Red-headed Malimbe**, que puso el broche de oro a una mañana realmente memorable.



Marabou Stork en el Jardín botánico de Entebbe ©Ferran López



Parte del grupo en acción y Crowned Hornbill en el Jardín botánico de Entebbe ©Ferran López



Bat Hawk en el Jardín botánico de Entebbe ©Ferran López

Dejamos nuestro alojamiento a primera hora de la mañana y nos dirigimos hacia el embarcadero de Mabamba Swamp, una de las zonas húmedas más emblemáticas de Uganda. Durante el trayecto ya conseguimos observar algunas especies interesantes, entre ellas **Golden-breasted Bunting** y **Striped Kingfisher**.

Una vez a bordo de nuestras canoas, comenzamos a adentrarnos lentamente por los canales que serpentean entre la densa vegetación de la marisma, en dirección a uno de los territorios del mítico **Shoebill** o **Picozapato**, una de las aves más icónicas y esperadas de nuestro viaje. Esta extraordinaria especie, de aspecto casi prehistórico, es el único representante vivo de la familia *Balaenicipitidae* y constituye uno de los grandes objetivos ornitológicos de cualquier viaje a Uganda.

Mientras navegábamos por este espectacular humedal, las observaciones se fueron sucediendo sin descanso. Conseguimos disfrutar de **White-faced Whistling-Duck**, **African Swampphen**, **Black Crane**, **Long-toed Lapwing**, **Squacco Heron**, **Yellow-billed Egret**, al menos dos enormes **Goliath Heron**, **African Marsh Harrier**, **Malachite Kingfisher**, **Pied Kingfisher** y un inesperado **Marsh Tchagra**, cuya presencia supuso una agradable sorpresa. También observamos **Winding Cisticola**, **Angola Swallow**, **Mosque Swallow** y **Fan-tailed Widowbird**, entre muchas otras especies. Finalmente, llegamos a escasos metros del nido de un **Shoebill**, donde pudimos contemplar a un adulto acompañado de su pequeño polluelo de apenas unos días de vida. ¡Una observación absolutamente extraordinaria y uno de los momentos más emocionantes e inolvidables de nuestro viaje!



Shoebill en las marismas de Mabamba ©Ferran López

Para finalizar la jornada, dedicamos las últimas horas de luz a explorar una colina situada en los alrededores de nuestro alojamiento, donde pudimos disfrutar de unas magníficas observaciones de **Ross's Turaco**, mejorando considerablemente las que habíamos tenido anteriormente. Durante el recorrido también conseguimos observar otras especies interesantes, como **Blue-spotted Wood-Dove**, **African Harrier-Hawk**, **Woodland Kingfisher**, **African Green-Pigeon** y **Scarlet-chested Sunbird**, entre otras.

Ya de regreso al lodge, después de disfrutar de una agradable cena y repasar nuestra extensa lista de aves del día, todavía nos esperaba una última sorpresa. Equipados con nuestro potente foco, salimos a explorar los jardines del alojamiento y conseguimos localizar un magnífico **African Wood-Owl**, poniendo así el broche de oro a una jornada repleta de excelentes observaciones ornitológicas. Finalmente, nos retiramos a nuestras habitaciones para disfrutar de un merecido descanso y recuperar fuerzas de cara a la siguiente jornada.



African Wood-Owl en Tilapia Lodge ©Ferran López

Día 3 – Ziwa Rhino Sanctuary y Parque Nacional de Murchinson Falls

Comenzamos una nueva jornada levantándonos temprano y, una vez más, después de desayunar en nuestro lodge, cruzamos un pequeño tramo del lago Victoria a bordo de nuestras embarcaciones. Nuestro destino era el **Ziwa Rhino Sanctuary**, un importante santuario de conservación donde tendríamos la oportunidad de observar a corta distancia al impresionante rinoceronte blanco. Este espacio protegido fue creado con el objetivo de recuperar la presencia de esta

especie en Uganda, después de que los últimos rinocerontes del país desaparecieran a principios de la década de 1980.

Sin embargo, antes de llegar al santuario, realizamos varias paradas ornitológicas a lo largo del recorrido. Una de las más interesantes tuvo lugar en los extensos herbazales de Kakoge, donde conseguimos observar especies tan atractivas como **Gray-crowned Crane**, **Speckled Mousebird**, **Black-headed Gonolek**, **Green-backed**

Camaroptera, Copper Sunbird, Golden-backed Weaver, Fan-tailed Widowbird, Wahlberg's Eagle y al menos dos **Marsh Widowbird**, entre otras.

Una vez llegamos al santuario, recibimos una interesante explicación sobre la historia del proyecto de conservación y la situación actual de los rinocerontes en Uganda. Posteriormente, acompañados por uno de los guardas del parque, iniciamos un recorrido a pie por la sabana en busca de estos impresionantes mamíferos. No tardamos demasiado en localizar dos grupos familiares de rinocerontes blancos,

que pudimos contemplar a muy corta distancia, disfrutando de una experiencia realmente emocionante e inolvidable.

Además de los rinocerontes, nuestra visita al santuario también nos permitió seguir ampliando la lista de aves del viaje, con observaciones de **Helmeted Guineafowl, Bateleur, African Gray Hornbill, Broad-billed Roller, Meyer's Parrot, African Paradise-Flycatcher, Piacpiac, Rüppell's Starling** y **African Pipit**, entre otras especies que completaron una magnífica visita a este importante espacio natural de Uganda.



Rinoceronte blanco en Ziwa Rhino Sanctuary ©Ferran López

Continuamos nuestro recorrido en dirección al **Parque Nacional de Murchison Falls**, realizando varias paradas ornitológicas a lo largo del trayecto que nos permitieron seguir ampliando nuestra lista de especies. Entre las observaciones más destacadas figuraron **Gray Kestrel, Black-and-white-casqued Hornbill**, dos **White-thighed Hornbill**, **Red-faced Cisticola**, **Northern Black-Flycatcher**, **Grosbeak**

Weaver y **Yellow-fronted Canary**, entre otras.

Una vez dentro del parque nacional, seguimos la carretera principal en dirección norte, atravesando paisajes de gran belleza y disfrutando de nuevas observaciones de aves. Durante este recorrido conseguimos detectar **Tambourine Dove, Violet-backed Starling**, varios **Wahlberg's Eagle** y **African Gray Hornbill**, además de **Black Sawwing** y

African Palm Swift, entre otras especies además de disfrutar con la corta presencia de los innumerables Babuinos oliva.

Finalmente, alcanzamos el espectacular mirador de las **cataratas Murchison**, uno de los enclaves naturales más impresionantes de Uganda. Desde allí pudimos contemplar la extraordinaria fuerza con la que las aguas del río Nilo se precipitan por una estrecha

garganta de apenas siete metros de anchura, formando una impresionante caída de unos 43 metros antes de continuar su recorrido hacia el lago Alberto. Un espectáculo natural realmente sobrecogedor que, además, nos permitió disfrutar de la observación de dos **Rock Pratincole** y varios **African Pied Wagtail**, poniendo el broche de oro a nuestra visita a este emblemático lugar.



Grupo en el mirador de las cataratas de Murchinson ©Ferran López



Nuestros vehículos entre babuinos oliva en el PN de Murchinson Falls y White-thighed Hornbill ©Ferran López

Finalmente, emprendimos el camino hacia nuestro alojamiento, aprovechando los últimos momentos de luz para seguir sumando nuevas especies a nuestra lista, entre ellas **Yellow-mantled Widowbird**, **Sulphur-breasted Bushshrike** y **Wattled Lapwing**. Ya entrada la noche, llegamos a nuestro lodge, donde nos

instalamos cómodamente y disfrutamos de una agradable cena. Como cada jornada, dedicamos un rato a repasar y completar nuestra lista diaria de aves, recordando las numerosas observaciones realizadas a lo largo del día, antes de retirarnos a nuestras habitaciones para disfrutar de un merecido descanso.

Día 4 – Safari en el Parque Nacional de Murchinson Falls

Nuestra cuarta jornada por Uganda comenzaba con grandes expectativas y mucha ilusión, sabiendo que teníamos por delante un día completo de safari explorando los diferentes rincones del espectacular **Parque Nacional de Murchison Falls**. Tras tomar un café a primera hora de la mañana, y con nuestro desayuno preparado para disfrutarlo más tarde en plena naturaleza, subimos a nuestros vehículos 4x4 con techo elevable y nos adentramos por las pistas de este extraordinario espacio natural, dispuestos a disfrutar de una de las jornadas más emocionantes de nuestro viaje.

La actividad ornitológica fue intensa desde los primeros momentos y, a medida que avanzábamos por las extensas sabanas, los humedales y las zonas de vegetación arbustiva, las observaciones se sucedían prácticamente sin descanso. La diversidad de aves resultó realmente espectacular, hasta el punto de conseguir registrar **nada menos que 87 especies durante aquella primera mañana de safari**.

Entre las numerosas especies observadas destacaron **Heuglin's Spurfowl**, **Mourning Collared-Dove**, **Black-billed Wood-Dove**, la impresionante **Denham's Bustard**, **White-browed Coucal**, hasta tres **Dideric Cuckoo**, **African Cuckoo**, dos **Water Thick-knee**, **Senegal Thick-knee**, **Spur-winged Lapwing**, **Black-headed Lapwing**, **Crowned Lapwing**, **Wattled Lapwing** y **Kittlitz's Plover**. También disfrutamos de **Gull-billed Tern**, junto a una **Caspian Tern**, una especie poco habitual en esta zona del parque.

Las zonas húmedas y los alrededores del río Nilo también nos proporcionaron excelentes observaciones de **African Darter**, **Yellow-billed Egret**, **Goliath Heron** y otro ejemplar del

extraordinario **Shoebill** o **Picozapato**, aunque en esta ocasión lo observamos a bastante distancia. A estas especies se sumaron **Pink-backed Pelican**, **Lappet-faced Vulture**, **White-backed Vulture**, **Rüppell's Griffon**, **Tawny Eagle**, hasta tres **Dark Chanting-Goshawk** y **African Fish-Eagle**, entre otras rapaces.

Tampoco faltaron especies tan llamativas como **Blue-naped Mousebird** y, especialmente, hasta seis enormes **Abyssinian Ground-Hornbill**, cuya imponente presencia en plena sabana fue uno de los grandes atractivos de la mañana. La lista siguió creciendo con **Swallow-tailed Bee-eater**, **Northern Carmine Bee-eater**, **African Pygmy Kingfisher**, **Gray-headed Kingfisher**, **Spot-flanked Barbet**, **Black-billed Barbet**, dos **Nubian Woodpecker**, **Black-crowned Tchagra**, **Brown-crowned Tchagra** y **Gray-backed Fiscal**.

Entre los numerosos paseriformes conseguimos identificar **Rattling Cisticola**, **Wire-tailed Swallow**, **Lesser Striped Swallow**, **Yellow-billed Oxpecker**, **Silverbird**, **Spotted Morning-Thrush**, **Beautiful Sunbird**, **Speckle-fronted Weaver**, **White-browed Sparrow-Weaver**, **Chestnut-crowned Sparrow-Weaver**, **Little Weaver**, **Slender-billed Weaver**, **Vitelline Masked-Weaver**, **Northern Red Bishop** y **Black-rumped Waxbill**. Sin embargo, una de las observaciones más celebradas fue la de un escaso y siempre difícil de detectar **Quailfinch**, una especie especialmente valorada por los aficionados a la ornitología y que puso un magnífico broche a nuestra extensa lista de aves de la mañana.

Pero el espectáculo no se limitó únicamente a las aves. Durante nuestro recorrido también disfrutamos de una extraordinaria variedad de mamíferos, muchos de ellos observados a corta distancia desde nuestros vehículos. Entre las

especies más destacadas figuraron el **elefante africano de sabana**, la **jirafa de Rothschild**, el **búfalo cafre**, el **hipopótamo**, el **león**, el **kob de Uganda**, el **alcélafo de Jackson**, el **oribi**, el **cobo de agua**, el **facóquero común**, el **babuino oliva**, el **mono patas**, el **colobo blanco y negro** y el

murciélago de alas amarillas. A todos ellos se sumó también el impresionante **cocodrilo del Nilo**, completando una mañana de safari absolutamente memorable, tanto por la cantidad como por la extraordinaria diversidad de fauna observada.



Jirafa de Rothschild, Oribi, Alcelafo de Jackson, Denham's Bustard, Elefante africano de sabana, Búfalo cafre, León, y Mono patas en el PN de Murchinson Falls ©Ferran López

Continuamos nuestro safari explorando diferentes sectores del parque nacional, lo que nos permitió seguir ampliando nuestra lista de aves con nuevas observaciones de **Ring-necked Dove**, **Martial Eagle**, otros cuatro impresionantes **Abyssinian Ground-Hornbill**, **Little Bee-eater**, **Gray-headed Kingfisher**, **Cardinal Woodpecker** y **Northern Crombec**, entre otras especies.

Finalmente, regresamos a nuestro alojamiento para almorzar y disfrutar de un breve y merecido descanso después de una mañana realmente intensa. Sin embargo, nuestra jornada estaba lejos de terminar y, poco después, nos pusimos nuevamente en marcha, dispuestos a seguir descubriendo la extraordinaria riqueza ornitológica y faunística de este espectacular parque nacional.

Nuestra primera parada de la tarde consistió en un recorrido a pie por uno de los márgenes del Nilo Alberto, al que pudimos acceder directamente desde nuestro alojamiento. Allí disfrutamos de nuevas e interesantes observaciones de **Marabou Stork**, **Blue-breasted Bee-eater**, **Nubian Woodpecker**, **Northern Puffback**, **Buff-bellied Warbler**, **Carruthers's Cisticola**, **Spectacled Weaver** y **Red-cheeked Cordonbleu**. También tuvimos la oportunidad de contemplar un bonito grupo de **Brown Babbler**, que nos ofrecieron excelentes momentos de observación.

Tras esta agradable caminata, volvimos a subir a nuestros vehículos 4x4 para dirigirnos hacia otro sector del parque nacional, donde continuamos

explorando diferentes hábitats en busca de nuevas especies. Las observaciones no tardaron en llegar y pronto conseguimos localizar **Red-necked Falcon**, **Blue-headed Coucal**, **Goliath Heron**, **African Sacred Ibis**, **Red-throated Bee-eater**, **Siffling Cisticola**, **Silverbird**, **Black-bellied Firefinch**, **Bar-breasted Firefinch**, **Long-crested Eagle**, dos **Copper Sunbird** y **Western Banded Snake-Eagle**. Especialmente atractiva resultó la observación de cuatro **Red-throated Bee-eater**, una de las especies más vistosas de esta región africana. Además, de otro **león** subido a un tronco que nos ofreció bonitas imágenes.

Todavía tuvimos tiempo de realizar una última parada en otro enclave especialmente interesante, donde conseguimos añadir **Vinaceous Dove**, **Violet-backed Starling**, **Black-bellied Bustard**, **Red-winged Gray Warbler**, **Croaking Cisticola** y **Pale Flycatcher**, completando así una tarde repleta de excelentes observaciones.

Con las últimas luces del día, emprendimos el camino de regreso a nuestro alojamiento, satisfechos después de una jornada de safari verdaderamente extraordinaria, tanto por la diversidad de aves como por los numerosos mamíferos que habíamos tenido la oportunidad de contemplar. Ya en nuestro lodge, disfrutamos de una agradable cena y, tras repasar nuestra extensa lista de especies observadas, nos retiramos a descansar para recuperar fuerzas de cara a las nuevas aventuras que nos esperaban al día siguiente.



León en el PN de Murchinson Falls ©Ferran López



Red-throated Bee-eater y Heuglin's Spurfowl en el PN de Murchinson Falls ©Ferran López

Día 5 – Parque Nacional de Murchinson Falls y traslado a Hoima

Una nueva mañana en el espectacular **Parque Nacional de Murchison Falls** comenzó, una vez más, disfrutando de la intensa actividad ornitológica en los alrededores de nuestro alojamiento. A primera hora, y aprovechando las excelentes condiciones para la observación de aves, conseguimos localizar especies tan interesantes como **Blue-headed Coucal**, **Purple Heron**, nuevamente **Blue-breasted Bee-eater**, **Yellow-fronted Tinkerbird**, **Marsh Tchagra** y **Swamp Flycatcher**, entre otras, que nos permitieron empezar la jornada con muy buenas sensaciones.

Tras estas primeras observaciones, subimos a nuestros vehículos 4x4 y emprendimos el recorrido por la carretera principal del parque, realizando diferentes paradas en aquellos puntos que consideramos más interesantes. Durante este primer tramo conseguimos observar **Red-eyed Dove**, **Black Cuckooshrike**, **Black-crowned Tchagra**, **Brown-backed Camaroptera**, **Chestnut-crowned Sparrow-Weaver** y **Fawn-breasted Waxbill**, que figuraron entre las especies más destacadas de esta parte del recorrido.

Posteriormente, nos detuvimos en un segundo enclave que resultó especialmente productivo, donde la actividad de las aves fue constante y nos permitió seguir ampliando nuestra lista. Allí disfrutamos de nuevas observaciones de **Eastern Plantain-eater**, **Red-throated Bee-eater**, **African Pygmy Kingfisher**, **Beautiful Sunbird** y **Wing-snapping Cisticola**, además de volver a localizar varios **Wahlberg's Eagle**. También conseguimos observar **African Black-headed Oriole**, **Gray-headed Bushshrike** y tres magníficos **Lesser Blue-eared Starling**.

Sin embargo, uno de los momentos más interesantes de la mañana llegó cuando conseguimos escuchar el característico reclamo de un **Thick-billed Cuckoo**, una especie extraordinariamente escasa y de presencia muy poco habitual en esta zona de Uganda. Aunque dedicamos un tiempo a intentar localizarlo entre la vegetación, finalmente no conseguimos observarlo, por lo que tuvimos que conformarnos con su identificación auditiva. Aun así, se trató de un registro especialmente interesante que añadió un atractivo adicional a otra excelente mañana de observación de aves en Murchison Falls.



Wahlberg's Eagle en el PN de Murchinson Falls ©Ferran López

Continuamos nuestro recorrido en dirección sur, todavía dentro de los límites del **Parque Nacional de Murchison Falls**, realizando numerosas paradas cada vez que detectábamos alguna especie interesante. De este modo, conseguimos observar **Fork-tailed Drongo**, nuevos ejemplares de **Yellow-mantled Widowbird**, **Marico Sunbird**, **Cardinal Quelea** y **Black-winged Bishop**. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de este tramo llegó cuando finalmente conseguimos localizar una de las especies que más esperábamos encontrar: tres magníficos **White-crested Helmetshrike**, que nos brindaron una excelente observación.

Una vez abandonamos los límites del parque nacional, proseguimos nuestro viaje hacia el sur con el objetivo de alcanzar la localidad de Hoima durante la tarde. A pesar de tener por delante un buen número de kilómetros, continuamos aprovechando cualquier oportunidad para detenernos y seguir disfrutando de la extraordinaria diversidad ornitológica de Uganda.

Una de las primeras paradas estuvo motivada por la observación de nuestra primera **African Woolly-necked Stork**, una especie que todavía no habíamos conseguido registrar durante el viaje. Posteriormente, en diferentes puntos del

recorrido, fuimos añadiendo nuevas observaciones de dos **White-rumped Seedeater**, **Vitelline Masked-Weaver**, **Silverbird**, dos **Western Banded Snake-Eagle**, **Village Indigobird**, un bando de unos 40 **African Openbill** que sobrevolaron la zona y **Yellow-billed Stork**, entre otras especies.

Un poco más adelante decidimos detener nuevamente nuestros vehículos para recorrer a pie un pequeño tramo junto a la carretera, una parada que resultó especialmente productiva. Allí conseguimos observar **Namaqua Dove**, **Cinnamon-breasted Bunting**, **Speckled Mousebird**, **White-shouldered Black-Tit**, **Foxy Cisticola**, **White-browed Scrub-Robin** y **Black-faced Waxbill**. Como magnífico colofón a esta parada, disfrutamos de la presencia de una espectacular **Long-crested Eagle** posada sobre uno de los postes situados junto a la carretera, que nos permitió contemplar a corta distancia su elegante silueta y su inconfundible cresta.

De este modo, nuestro desplazamiento hacia Hoima se convirtió en una nueva y excelente jornada de observación de aves, demostrando una vez más que, en Uganda, incluso los trayectos entre diferentes destinos pueden proporcionar encuentros ornitológicos realmente memorables.



Cinnamon-breasted Bunting y Long-crested Eagle dirección Hoima ©Ferran López

Realizamos una parada para almorzar en una pequeña localidad de la zona y, poco después, reanudamos nuestro recorrido hasta alcanzar finalmente nuestro alojamiento en Hoima. Una vez allí, descargamos nuestro equipaje y, sin perder demasiado tiempo, decidimos aprovechar las últimas horas de luz para realizar una caminata por los alrededores del lodge, una decisión que resultó especialmente acertada, ya que la actividad ornitológica fue extraordinaria.

Durante este agradable recorrido, en el que exploramos los diferentes ambientes que rodeaban nuestro alojamiento, conseguimos observar una magnífica variedad de especies, algunas de ellas especialmente interesantes. Entre las más destacadas figuraron dos **Scaly Spurfowl**, **Blue Malkoha**, dos **Double-toothed Barbet**, **Red-headed Lovebird**, **Red-shouldered Cuckooshrike**, **African Paradise-Flycatcher**, **Yellow-bellied Hyliota** y **African Blue Flycatcher**.

La lista continuó creciendo con nuevas observaciones de **White-chinned Prinia**,


Whistling Cisticola, **Brown Babbler**, **Splendid Starling**, **Bronze-tailed Starling** y **Brown-backed Scrub-Robin**. Tampoco faltaron varios suimangas de gran belleza, como **Collared Sunbird**, **Green-throated Sunbird** y **Bronze Sunbird**, que aportaron un magnífico toque de color a nuestras observaciones.

Especialmente interesantes resultaron también los registros de **Gray-headed Nigrita**, **Gray-headed Oliveback** y **Brown Twinspot**, tres pequeños y atractivos estríldidos que contribuyeron a redondear una tarde verdaderamente productiva, junto con otras muchas especies que fuimos detectando durante el recorrido.

Finalmente, cuando la luz del día comenzaba a desaparecer, regresamos a nuestro alojamiento plenamente satisfechos por la excelente jornada ornitológica que habíamos disfrutado. Tras una agradable cena y el habitual repaso de nuestra lista diaria de aves, nos retiramos a descansar, preparados para continuar al día siguiente nuestra aventura por tierras ugandesas.



African Paradise-Flycatcher de morfo blanco en Hoima ©Ferran López



Double-toothed Barbet y White-chinned Prinia en Hoima ©Ferran López

Día 6 – Hoima y traslado a Kibale

Comenzamos una nueva jornada desayunando temprano en nuestro hotel y, antes de emprender la marcha, aprovechamos para dar un breve paseo por sus alrededores. Durante este recorrido conseguimos observar nuevos ejemplares de **African Green-Pigeon** y, una vez más, dos magníficos **Double-toothed Barbet**, que nos permitieron disfrutar de excelentes observaciones a primera hora de la mañana.

Poco después, iniciamos nuestro desplazamiento en dirección sur, con el objetivo de alcanzar los impresionantes bosques de Kibale, uno de los enclaves naturales más interesantes de Uganda. Como ya venía siendo habitual durante nuestro viaje, aprovechamos el trayecto para realizar diferentes paradas ornitológicas en aquellos puntos que consideramos más prometedores, lo que nos permitió seguir ampliando nuestra extensa lista de aves.

Entre las especies más destacadas de este recorrido figuraron **Black Bishop**, **Black-crowned Waxbill**, **Black-and-white-casquet Hornbill**, **Yellow-fronted Canary**, **Tambourine Dove**, **Black-winged Kite**, hasta cinco espectaculares **Great Blue Turaco**, **White-throated Bee-eater** y

Yellow-rumped Tinkerbird. También conseguimos escuchar el característico canto de un **Western Nicator**, aunque, a pesar de nuestros intentos, no logramos localizarlo visualmente entre la vegetación. Además, tuvimos la sorpresa de observar brevemente una nutria, que desapareció rápidamente antes de que pudiéramos identificar con seguridad la especie.

Finalmente, tras pasar por la localidad de Fort Portal, alcanzamos el sector norte del impresionante **bosque de Kibale**, donde realizamos nuestra primera caminata por este extraordinario ecosistema tropical. El cambio de paisaje fue espectacular y pronto comenzamos a disfrutar de nuevas especies características de los ambientes forestales de África central.

Durante este primer contacto con el bosque conseguimos añadir a nuestra lista **Red-chested Cuckoo**, **Sabine's Spinetail**, **Yellow-spotted Barbet**, **Lesser Honeyguide**, **Lühder's Bushshrike**, **Little Green Sunbird** y hasta dos **White-breasted Nigrita**, entre otras aves.

Estas primeras observaciones nos permitieron comprobar la extraordinaria riqueza ornitológica de Kibale y aumentaron

todavía más nuestras expectativas ante las próximas jornadas de exploración de uno de

los bosques tropicales más fascinantes de Uganda.



Black-and-white-casquet Hornbill entre Hoima y Fort Portal ©Ferran López

Realizamos una parada para almorzar en un restaurante de la zona y, posteriormente, nos dirigimos a nuestro alojamiento para descargar el equipaje e instalarnos cómodamente. Incluso durante estos primeros momentos de descanso pudimos observar algunas especies interesantes en los jardines del lodge, como **African Blue Flycatcher** y **Olive-bellied Sunbird**.

Sin perder demasiado tiempo, decidimos aprovechar las horas de luz que todavía nos quedaban para explorar uno de los márgenes del bosque de Kibale, con la intención de seguir descubriendo nuevas especies propias de este extraordinario ecosistema. Durante esta primera prospección destacaron las observaciones de **Eastern Yellow-billed Barbet**, **Black Bishop** y **Grosbeak Weaver**, entre otras aves.

Posteriormente, nos desplazamos hasta los alrededores del **Guereza Canopy Lodge**, donde realizamos una caminata que resultó especialmente productiva. La actividad ornitológica fue constante y pronto comenzamos a disfrutar de magníficas observaciones, entre las que destacaron hasta ocho espectaculares **Great Blue Turaco**, **White-rumped Swift**, **Speckled Tinkerbird**, **Yellow-throated Tinkerbird** y un inesperado **Speckle-breasted Woodpecker**, cuya presencia supuso una de las sorpresas más interesantes de la tarde.

Continuamos recorriendo los senderos y las zonas de vegetación que rodeaban el alojamiento, consiguiendo localizar **Brown-throated Wattle-eye**, **Gray-green Bushshrike**, **Black-headed Paradise-Flycatcher**, **Masked Apalis**, **Honeyguide Greenbul**, **Little Greenbul** y **Green White-**

eye. También conseguimos escuchar un **Gray Tit-Flycatcher**, aunque no llegamos a observarlo, y completamos nuestra lista con **Ashy Flycatcher**, **Little Green Sunbird** y **Black-necked Weaver**, entre otras especies características de estos ambientes forestales. Además también, vimos **Cercopiteco de cola roja**, entre otros monos.

Cuando la tarde comenzaba a llegar a su fin, unos jóvenes de una propiedad cercana se ofrecieron amablemente a mostrarnos una **Vívora Rinoceronte** y un **Escarabajo Goliat** que habían localizado en los alrededores,

brindándonos la oportunidad de descubrir también algunos de los pequeños habitantes de este fascinante entorno natural.

Finalmente, casi sin darnos cuenta, la noche cayó sobre el bosque y emprendimos el regreso a nuestro lodge, plenamente satisfechos después de otra intensa jornada de observaciones. Una vez en nuestro alojamiento, disfrutamos de una agradable cena y nos retiramos a descansar, con la ilusión de continuar explorando al día siguiente la extraordinaria biodiversidad de los bosques de Kibale.



Grupo en acción ©Mireia P. Martos



Víbora Rinoceronte y Escarabajo Goliat en Kibale ©Ferran López

Día 7 – Bosque del Parque Nacional de Kibale

Comenzaba una de las mañanas más emocionantes y esperadas de nuestro viaje por Uganda, ya que teníamos por delante uno de los grandes retos ornitológicos de esta aventura: intentar localizar a la espectacular **Green-breasted Pitta**, una de las especies más esquivas, difíciles de observar y codiciadas de los bosques tropicales africanos. Un auténtico desafío que afrontábamos con enormes expectativas y la ilusión de poder contemplar una de las grandes joyas ornitológicas del **Parque Nacional de Kibale**.

Para intentar conseguirlo, tuvimos que levantarnos todavía más temprano de lo habitual y, después de desayunar, nos dirigimos hacia uno de los territorios conocidos de esta especie, situado en el interior del bosque tropical. Como es habitual en este espacio protegido, realizamos la excursión acompañados por los guardas del parque nacional y varios guías locales, grandes conocedores de la fauna y de los rincones más recónditos del bosque.

Una vez en la zona, comenzamos a prospectar cuidadosamente el sotobosque, avanzando con sigilo y prestando especial atención a cualquier movimiento o sonido que pudiera delatar la presencia de nuestra especie objetivo. Tras un buen rato de

búsqueda, finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando: uno de nuestros guías locales había conseguido localizar una **Green-breasted Pitta**!

Rápidamente, pero procurando movernos con el máximo cuidado y discreción, nos dirigimos hacia el punto donde había sido detectada. La emoción era enorme y, después de varios intentos, conseguimos contemplar a esta extraordinaria ave en diferentes momentos, disfrutando de una de las observaciones más especiales y memorables de todo nuestro viaje.

Pero la mañana todavía nos reservaba muchas otras sorpresas. Durante nuestra exploración de este magnífico bosque tropical también conseguimos observar especies tan interesantes como **Narina Trogon**, **Dusky Long-tailed Cuckoo**, **Hairy-breasted Barbet**, **Western Black-headed Oriole**, **Chestnut Wattle-eye** y **Buff-throated Apalis**, además de nuevas observaciones de **Honeyguide Greenbul**, **White-throated Greenbul** y **Rufous Flycatcher-Thrush**, entre otras aves.

De este modo, nuestra incursión por el interior del Parque Nacional de Kibale se convirtió en una experiencia ornitológica verdaderamente extraordinaria, coronada por el encuentro con la mítica **Green-breasted Pitta**, uno de los grandes objetivos de nuestro viaje por Uganda.



Momentos del tensión buscando del Green-breasted Pitta en el bosque de Kibale ©Ferran López

Todavía emocionados por el extraordinario encuentro con la **Green-breasted Pitta**, continuamos explorando diferentes sectores del bosque de Kibale, aunque en esta ocasión decidimos concentrar nuestros esfuerzos en los márgenes de la carretera, desde donde podíamos observar con mayor facilidad la actividad de las aves en las copas de los árboles y los claros del bosque.

Durante este recorrido conseguimos disfrutar de nuevas observaciones de **Sabine's Spinetail**, **White-rumped Swift**, **Wahlberg's Eagle** y **Black-and-white-casqued Hornbill**. También detectamos por su característico reclamo un **Blue-throated Roller**, aunque, a pesar de nuestros intentos, no conseguimos localizarlo visualmente. Completamos esta primera parada con interesantes observaciones de **Hairy-breasted Barbet** y **Blue-throated Brown Sunbird**, entre otras especies.

Posteriormente, nos desplazamos hasta otro tramo de carretera que también resultó productivo, donde conseguimos observar **Green Crombec** y **Green-throated Sunbird**, además de escuchar un **Black-throated Apalis** que permaneció oculto entre la densa vegetación.

Finalmente, emprendimos el camino hacia el hermoso **lago Mkuruba**, en un entorno natural privilegiado y rodeado de una exuberante vegetación. Nada más llegar, aprovechamos para realizar una primera prospección ornitológica por los alrededores, que pronto nos deparó nuevas e interesantes observaciones.

Entre las especies más destacadas figuraron **Little Grebe**, **Crowned Hornbill**, **Cinnamon-chested Bee-eater** y al menos dos impresionantes **Giant Kingfisher**, cuya presencia fue uno de los grandes atractivos de este primer recorrido. También

conseguimos observar nuevamente **Lühder's Bushshrike**, además de **Mosque Swallow**, **Joyful Greenbul**, **Cabanis's Greenbul**, **African Dusky Flycatcher** y **Gray-**

winged Robin-Chat, entre otras aves características de estos ambientes forestales. De este modo, y casi sin darnos cuenta, llegó la hora del almuerzo.



Macho de Chestnut Wattle-eye en el bosque de Kibale ©Ferran López



Giant Kingfisher y almuerzo en el lago Mkuruba ©Ferran López

Después del almuerzo, todavía dispusimos de algo de tiempo para seguir explorando los alrededores del lodge, aprovechando al máximo las últimas horas de estancia en este magnífico entorno forestal. Durante este breve recorrido conseguimos añadir nuevas especies a nuestra lista, entre ellas **Lesser Honeyguide**, **Golden-crowned Woodpecker**, **Buff-spotted Woodpecker**, **Brown-throated Wattle-eye**, **Speckled Tinkerbird** y **Scarlet-chested Sunbird**, completando así una visita realmente productiva a los bosques de Kibale y sus alrededores.

Finalmente, llegó el momento de despedirnos de este espectacular enclave natural y subir nuevamente a nuestros vehículos 4x4 para continuar nuestro viaje hacia el sur, con destino al **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, otro de los grandes espacios protegidos de Uganda.

A medida que nos adentrábamos por las carreteras que atraviesan las inmensas extensiones de sabana del parque, el paisaje fue cambiando progresivamente y pronto comenzaron a aparecer nuevas especies características de estos ambientes abiertos. Entre las primeras observaciones destacaron nuestras dos primeras **Black-bellied Bustard**, además de **Black-headed Heron**, **Hamerkop**, **Black-chested Snake-Eagle**, **Olive Bee-eater** y **Northern Fiscal**, entre otras aves que fuimos detectando durante el recorrido.

Posteriormente, decidimos realizar una parada para explorar los alrededores del puente sobre el **canal de Kazinga**, uno de los enclaves más interesantes del parque por la gran concentración de aves acuáticas y otras especies asociadas a los humedales. La parada resultó especialmente productiva y nos permitió disfrutar de observaciones de **Squacco Heron**, **Great Egret**, **African Fish-Eagle**, **Woodland Kingfisher**, **Lesser Swamp Warbler**, **Slender-billed Weaver**, **Northern Brown-throated Weaver** y **Grosbeak Weaver**, entre otras especies.

Con la tarde ya bastante avanzada, reanudamos nuestro recorrido en dirección al alojamiento, aunque todavía tuvimos tiempo de realizar algunas observaciones adicionales, entre las que destacaron tres **White-headed Barbet**, **Baglaffeht Weaver** y **Yellow Bishop**, que contribuyeron a completar una jornada especialmente variada en cuanto a hábitats y especies observadas.

Finalmente, llegamos a nuestro lodge, donde recibimos una cálida bienvenida por parte del personal. Tras instalarnos cómodamente en nuestras habitaciones, disfrutamos de una agradable cena y del habitual repaso de nuestra lista diaria de aves, antes de retirarnos a descansar y recuperar fuerzas para las nuevas jornadas de safari que nos esperaban en el espectacular Parque Nacional de Queen Elizabeth.



Black-bellied Bustard en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López

Día 8 – Parque Nacional Queen Elizabeth y canal de Kazinga

Comenzamos una nueva jornada en el espectacular **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, dispuestos a disfrutar de un intenso safari por algunos de los rincones más interesantes de este extraordinario espacio natural de Uganda. A bordo de nuestros vehículos 4x4 con techo elevable, recorrimos diferentes pistas e itinerarios que atraviesan extensas sabanas, zonas de matorral y humedales, explorando una gran variedad de hábitats que nos permitieron disfrutar de una magnífica diversidad de aves.

Desde primera hora de la mañana, la actividad ornitológica fue constante y las observaciones se sucedieron prácticamente sin descanso. Entre las primeras especies que conseguimos registrar destacaron **Helmeted Guineafowl**, **Crested Francolin**, **Common Quail**, **Harlequin Quail**, **Red-necked Spurfowl**, **Mourning Collared-Dove**, **Ring-necked Dove**, **Eastern Plantain-eater** y **White-browed Coucal**. Especialmente interesante resultó también la observación de **African Crane**, una especie generalmente discreta y difícil de detectar entre la vegetación herbácea.

Las zonas húmedas y los pequeños encharcamientos que fuimos encontrando

durante el recorrido también nos proporcionaron excelentes observaciones de limícolas, entre las que destacaron hasta dos **Three-banded Plover**, **Senegal Lapwing**, **Crowned Lapwing**, **Wattled Lapwing** y **Kittlitz's Plover**. A estas especies se sumó la presencia de **Lesser Flamingo**, que aportó un atractivo adicional a nuestra lista de aves acuáticas.

Las rapaces tampoco faltaron durante el safari, destacando la observación del impresionante **Lappet-faced Vulture**, uno de los buitres más grandes y poderosos del continente africano. Continuamos ampliando nuestra lista con especies tan interesantes como **Little Bee-eater**, **Red-shouldered Cuckooshrike** y **Western Black-headed Batis**, además de varias aves características de las extensas praderas y sabanas del parque.

Entre estas últimas conseguimos observar **Flappet Lark**, **Rufous-naped Lark**, **Croaking Cisticola**, **White-browed Robin-Chat**, **Marico Sunbird**, **Red-billed Quelea**, **Fawn-breasted Waxbill**, **Crimson-rumped Waxbill**, **African Pipit** y **Yellow-throated Longclaw**, entre muchas otras especies.



Kittlitz's Plover en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López



Senegal Lapwing en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López

Continuamos explorando otro sector del espectacular **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, desplazándonos hasta los alrededores del **lago Bunyampaka**, donde seguimos disfrutando de excelentes observaciones ornitológicas. Durante este recorrido conseguimos localizar nuevos ejemplares de **Senegal Lapwing**, además de **Small Buttonquail**, **White-backed Vulture**, **Bateleur** y **Northern Fiscal**, entre otras especies características de las sabanas y los ambientes abiertos del parque.

Posteriormente, nos dirigimos hacia el embarcadero situado junto al puente del **canal de Kazinga**, donde nos esperaba una de las experiencias más espectaculares de nuestro viaje por Uganda: una navegación por buena parte de este extraordinario canal natural, que conecta los lagos Eduardo y Jorge y constituye uno de los enclaves de mayor riqueza faunística del país.

Desde los primeros momentos de navegación, el espectáculo fue

sencillamente impresionante. Las orillas del canal estaban repletas de vida y pudimos contemplar a muy corta distancia numerosos **hipopótamos**, algunos descansando en el agua y otros agrupados junto a las orillas, además de **elefantes africanos de sabana**, **búfalos cafres**, **cerdos gigantes del bosque**, **varanos del Nilo** y enormes **cocodrilos del Nilo**. La concentración de grandes mamíferos y la posibilidad de observarlos tranquilamente desde nuestra embarcación convirtieron este recorrido en una experiencia verdaderamente inolvidable.

Por supuesto, las aves también fueron protagonistas absolutas de la excursión, con una diversidad extraordinaria y excelentes oportunidades para la observación y la fotografía. Entre las numerosas especies que conseguimos registrar destacaron **Egyptian Goose**, **Black-billed Wood-Dove**, **Black Crake**, **Water Thick-knee** y un precioso grupo de **African Skimmer**, una de

las especies más atractivas y características de los grandes ríos y lagos africanos.

La lista continuó creciendo con observaciones de **White-winged Tern**, **Yellow-billed Stork**, **Reed Cormorant**, hasta tres **African Sacred Ibis**, **African Spoonbill**, **Yellow-billed Egret** y el impresionante **Goliath Heron**, cuya enorme silueta destacaba entre las aves acuáticas que ocupaban las orillas del canal.

Tampoco faltaron algunas rapaces, como **Palm-nut Vulture** y **African Fish-Eagle**, además de otras especies tan interesantes como **Olive Bee-eater**, **Malachite**

Kingfisher, **Pied Kingfisher**, **Broad-billed Roller**, **Black-headed Gonolek** y **Yellow-billed Oxpecker**, entre muchas otras aves que fuimos descubriendo durante la navegación.

Sin duda, el recorrido en barco por el canal de Kazinga fue uno de los momentos más memorables de nuestra estancia en el Parque Nacional de Queen Elizabeth. La extraordinaria concentración de fauna, la proximidad de los animales y la belleza del paisaje nos permitieron disfrutar de un auténtico espectáculo de la naturaleza, difícil de olvidar y que confirmó, una vez más, la increíble biodiversidad de Uganda.



Cocodrilo del Nilo en el Canal de Kazinga ©Ferran López



African Skimmer en el Canal de Kazinga ©Ferran López



Elefante, African Spoonbill, African Fish-Eagle y fotografiando elefantes en el Canal de Kazinga ©Ferran López

Pero nuestra jornada estaba lejos de terminar. Después de la extraordinaria experiencia vivida durante la navegación por el canal de Kazinga, volvimos a subir a nuestros vehículos 4x4 para continuar explorando otros sectores del espectacular **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, aprovechando al máximo las últimas horas de luz.

Una vez más, las observaciones ornitológicas se sucedieron prácticamente sin descanso, permitiéndonos seguir ampliando nuestra extensa lista de especies. Entre las más destacadas figuraron **Brown Snake-Eagle**, nuevos ejemplares de **Small Buttonquail**, **Marabou Stork**, **Black Goshawk**, **Common Scimitarbill**, **Golden-crowned Woodpecker** y dos **Cardinal Woodpecker**. También conseguimos observar **Tropical Boubou**, **Fork-tailed Drongo**, **Siffling Cisticola**, **White-headed Sawwing**, **Holub's Golden-Weaver**, **Red-collared Widowbird**, **Green-winged Pytilia** y **African Firefinch**.

Especialmente interesante resultó la observación de hasta dos magníficos **Golden-breasted Bunting**, una especie de llamativa coloración que puso un excelente broche a nuestra intensa actividad ornitológica de la tarde.

Finalmente, cuando las últimas luces del día comenzaban a desaparecer sobre las inmensas sabanas del parque, emprendimos el camino de regreso a nuestro alojamiento. Llegamos plenamente satisfechos, después de haber disfrutado de una jornada verdaderamente extraordinaria, repleta de magníficas observaciones de aves, grandes mamíferos y paisajes inolvidables.

Tras una agradable cena y el habitual repaso de nuestra extensa lista diaria de especies, nos retiramos a descansar con la sensación de haber vivido **uno de los días más emocionantes, intensos y completos de todo nuestro viaje por Uganda**. Sin duda, una de esas jornadas que permanecerán durante mucho tiempo en nuestra memoria.



Hipopótamos en el Canal de Kazinga ©Ferran López

Día 9 – Parque Nacional Queen Elizabeth

Comenzamos una nueva jornada en el espectacular **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, con el objetivo de recorrerlo de norte a sur y seguir descubriendo la extraordinaria diversidad de paisajes y fauna que alberga este impresionante espacio natural de Uganda.

Después de desayunar en nuestro alojamiento, emprendimos la marcha por la carretera principal del parque, realizando, como ya era habitual, numerosas paradas para observar las aves que íbamos encontrando a nuestro paso. Desde los primeros momentos, la actividad ornitológica fue intensa y pronto conseguimos disfrutar de interesantes observaciones de **Blue-naped Mousebird**, **Common Scimitarbill**, **Spot-flanked Barbet**, **Gray-capped Warbler**, **Black-necked Weaver**, **African Green-Pigeon**, **Sulphur-breasted Bushshrike** y **Moustached Grass-Warbler**.

La lista continuó creciendo con nuevas observaciones de **African Red-rumped Swallow**, **Brown-backed Scrub-Robin**, dos **African Yellow-Warbler**, **Horus Swift** y **Marsh Tchagra**, entre otras especies que contribuyeron a hacer especialmente productivo este primer tramo de nuestro recorrido.

Sin embargo, cuando estábamos completamente concentrados en la observación de aves, nos llevamos una sorpresa inesperada. De repente, una **hiena manchada** cruzó rápidamente la carretera justo por detrás de nuestro vehículo y desapareció entre unos arbustos cercanos, dejándonos apenas unos instantes para contemplarla. Decidimos regresar a los alrededores del puente sobre el **canal de Kazinga** para explorar nuevamente este interesante enclave y sus zonas adyacentes,

donde todavía esperábamos encontrar algunas especies que se nos habían escapado durante las jornadas anteriores. La parada resultó productiva y pronto conseguimos observar un activo grupo de **Black-lored Babbler**, además de **Green-headed Sunbird**, **Common Swift** y **Little Swift**, entre otras aves.

Posteriormente, continuamos nuestro recorrido por las pistas de este sector del **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, atravesando diferentes ambientes de sabana y zonas húmedas que nos permitieron seguir ampliando nuestra lista de especies. La actividad ornitológica volvió a ser intensa y las observaciones se sucedieron a lo largo del trayecto.

Entre las especies más destacadas figuraron **Klaas's Cuckoo**, **Water Thick-knee**, **Gray-hooded Gull**, el espectacular **Saddle-billed Stork**, **African Sacred Ibis** y **Pink-backed Pelican**. También disfrutamos de interesantes observaciones de rapaces, como **Brown Snake-Eagle** y **Tawny Eagle**, además de otras aves tan atractivas como **Red-throated Bee-eater**, **White-throated Bee-eater** y **Double-toothed Barbet**.

Las extensas zonas abiertas y los herbazales del parque también nos proporcionaron excelentes oportunidades para observar especies características de estos ambientes, entre ellas **Flappet Lark** y **Red-capped Lark**. Especialmente llamativa resultó la presencia de un grupo de unos 20 **Wattled Starling**, que pudimos contemplar mientras se desplazaban por la zona.

Finalmente, completamos nuestras observaciones con **Southern Red Bishop**, **White-winged Widowbird** y **Village Indigobird**, entre otras muchas especies.



Grupo de Pink-backed Pelican ©Ferran López

Continuamos explorando otros sectores de la orilla oriental del **lago Eduardo**, recorriendo diferentes pistas y ambientes naturales que nos permitieron seguir disfrutando de excelentes observaciones ornitológicas. Durante este tramo conseguimos localizar **Black Crake**, **White-headed Vulture**, nuevos ejemplares de **Brown Snake-Eagle**, **Blue-throated Roller**,

dos **Arrow-marked Babbler**, **Cassin's Flycatcher** y **Brimstone Canary**, entre otras especies.

Sin embargo, cuando menos lo esperábamos, llegó una de las grandes sorpresas de la jornada: ¡una espectacular **Crowned Eagle** apareció de repente volando justo sobre nuestras cabezas!



Crowned Eagle en el Parque Nacional Queen Elizabeth ©Ferran López



Blue-throated Roller en el Parque Nacional Queen Elizabeth ©Ferran López

Continuamos nuestro recorrido en dirección sur, explorando nuevos sectores del **Parque Nacional de Queen Elizabeth** y realizando diferentes paradas en algunos de los puentes que encontramos a nuestro paso. Estos enclaves resultaron especialmente interesantes para la observación de aves y nos permitieron añadir nuevas especies a nuestra lista, entre ellas **Stout Cisticola**, **Sooty Chat**, **Cardinal Quelea** y **Nubian Woodpecker**.

Después de disfrutar de un merecido almuerzo, volvimos a la carga con energías renovadas, dispuestos a seguir explorando otros rincones de este extraordinario parque nacional. La actividad ornitológica comenzó prácticamente desde el primer momento, ya que en los alrededores de la entrada conseguimos observar **Lesser Honeyguide**, **Greater Honeyguide**, **Brubru**, **Northern Black-Flycatcher** y **Bronze Sunbird**, una magnífica selección de especies que auguraba una tarde especialmente productiva.

Una vez nos adentramos nuevamente por las pistas del parque, las observaciones comenzaron a multiplicarse. Entre las primeras especies destacaron **Crested Francolin**, nuevos ejemplares de **Black-bellied Bustard**, **White-browed Coucal** y **Senegal Lapwing**, además de hasta cinco **Brown-chested Lapwing**, cuya presencia constituyó una de las observaciones más interesantes de la tarde.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas llegó cuando conseguimos localizar un espectacular **Temminck's Courser**, una especie de hábitos terrestres y coloración críptica que no siempre resulta fácil de detectar entre los herbazales y terrenos abiertos de la sabana.

La lista continuó creciendo con nuevas observaciones de dos impresionantes **Saddle-billed Stork**, **Goliath Heron**, **White-backed Vulture**, **African Gray Hornbill**, **Little Bee-eater**, **White-throated Bee-eater**, **African Pygmy Kingfisher** y **Gray-headed Kingfisher**. También conseguimos

disfrutar de **Black-headed Gonolek**, **Gray-backed Fiscal**, un solitario **Plain-backed Pipit** y varios **Yellow-throated Longclaw**, entre otras especies que completaron una tarde verdaderamente extraordinaria.

Con las últimas luces del día, todavía nos esperaba una nueva experiencia. Decidimos realizar una pequeña espera en una zona adecuada para intentar observar al esquivo **Swamp Nightjar**, objetivo que finalmente conseguimos cumplir, disfrutando de esta interesante especie de hábitos crepusculares y nocturnos.

Ya de regreso a nuestro lodge, y cuando la oscuridad se había apoderado por completo

del paisaje, todavía tuvimos la oportunidad de escuchar el característico reclamo de un **Fiery-necked Nightjar**, que puso el broche de oro a nuestra intensa actividad ornitológica.

Finalmente, llegó el momento de relajarnos y disfrutar de una agradable cena en nuestro alojamiento. Como cada noche, dedicamos un buen rato a repasar y completar nuestra extensa lista diaria de aves, recordando las numerosas observaciones realizadas a lo largo del día, antes de retirarnos a nuestras habitaciones para disfrutar de un merecido descanso después de otra jornada inolvidable por las sabanas de Uganda.



African Pygmy Kingfisher y Temminck's Courser en el Parque Nacional Queen Elizabeth ©Ferran López



Yellow-throated Longclaw en el Parque Nacional Queen Elizabeth ©Ferran López

Día 10 – Parque Nacional Queen Elizabeth y llegada al PN Impenetrable de Bwindi

Comenzamos nuestra última jornada en el maravilloso **Parque Nacional de Queen Elizabeth**, dispuestos a aprovechar al máximo las últimas horas de estancia en este extraordinario espacio natural de Uganda. Emprendimos nuestro recorrido en dirección sur, realizando numerosas paradas a lo largo de la carretera para seguir explorando los diferentes ambientes y disfrutar de las aves que íbamos encontrando a nuestro paso.

Desde primera hora de la mañana, la actividad ornitológica fue constante y pronto comenzaron a sucederse nuevas e interesantes observaciones. Entre las primeras especies destacaron varios **Red-necked Spurfowl**, **Speckled Pigeon**, **Blue-spotted Wood-Dove** y un bonito grupo de 14 **African Green-Pigeon** que descansaban posadas en un árbol. También conseguimos observar nuevamente las impresionantes rapaces **Bateleur** y **Palm-nut Vulture**, además de un solitario **Pearl-spotted Owlet**, cuya presencia supuso una de las sorpresas más agradables de la mañana.

Continuamos avanzando entre zonas de sabana, matorrales y pequeños sectores arbolados, donde conseguimos localizar dos **Green Woodhoopoe**, dos **Crested Barbet**, **Double-toothed Barbet**, **Lesser Honeyguide**, **Cardinal Woodpecker**, **Black Cuckooshrike**, **Sulphur-breasted Bushshrike** y **Fork-tailed Drongo**, entre otras especies características de estos ambientes.

Los pequeños passeriformes también tuvieron un protagonismo especial durante nuestro recorrido, con observaciones de **Northern Crombec**, **Trilling Cisticola**, **Croaking Cisticola**, **Gray Tit-Flycatcher** y **Sooty Chat**. Tampoco faltaron varios suimangas de gran belleza, como **Collared Sunbird**, **Bronze Sunbird**, **Marico Sunbird** y **Variable Sunbird**, que aportaron un magnífico toque de color a nuestra lista de aves. Finalmente, completamos esta excelente selección con **Yellow Bishop**, entre otras muchas especies que fuimos detectando durante la mañana.



Green Woodhoopoe en Queen Elizabeth ©Ferran López



Violet-backed Starling, Yellow-fronted tinkerbird y Pearl-spotted Owlet en Queen Elizabeth ©Ferran López

Continuamos nuestro recorrido en dirección sur y, una vez más, decidimos realizar una parada en un enclave que nos pareció especialmente interesante, situado en la ladera de una pequeña finca rodeada de vegetación. La decisión resultó acertada,

ya que conseguimos disfrutar de nuevas observaciones de **Ross's Turaco**, **Red-throated Wryneck** y **Arrow-marked Babbler**, que destacaron entre las especies más interesantes.



Red-throated Wryneck ©Ferran López

Reemprendimos nuestra ruta en dirección sur y, a medida que avanzábamos, el paisaje fue cambiando progresivamente, ofreciéndonos nuevas oportunidades para seguir ampliando nuestra lista de aves. Durante el trayecto conseguimos observar especies que todavía no habíamos registrado, como **Augur Buzzard**, **Mackinnon's Shrike** y **Lizard Buzzard**, entre otras, que hicieron todavía más entretenido nuestro desplazamiento.

Finalmente, alcanzamos la pequeña localidad de **Buhoma**, situada junto a uno de los principales accesos al espectacular **Parque Nacional de Bwindi Impenetrable**, uno de los bosques tropicales más extraordinarios de Uganda y uno de los enclaves más importantes de nuestro viaje. Una vez llegamos a nuestro lodge, dejamos el equipaje en el comedor y, sin perder demasiado tiempo, nos dispusimos a aprovechar las horas de luz que todavía nos quedaban para realizar nuestra primera exploración ornitológica de la zona.

Iniciamos una caminata por uno de los caminos principales del parque, adentrándonos en un entorno completamente diferente al de las extensas sabanas que habíamos recorrido durante las jornadas anteriores. La exuberante vegetación, los enormes árboles y la extraordinaria humedad del ambiente nos anunciaban que estábamos entrando en uno de los ecosistemas forestales más fascinantes de África oriental.

Pronto comenzaron a aparecer nuevas especies características de los bosques tropicales húmedos, algunas de ellas especialmente interesantes y difíciles de observar. Entre las primeras destacaron **African Emerald Cuckoo**, la impresionante **Crowned Eagle**, **Cinnamon-chested Bee-eater**, **Cassin's Honeybird**, dos **Willcocks's Honeyguide**, **Buff-spotted Woodpecker** y **Fine-banded Woodpecker**.

La actividad ornitológica continuó siendo intensa y conseguimos disfrutar de excelentes observaciones de **Petit's Cuckooshrike**, **Black-and-white Shrike-flycatcher**, dos **Pink-footed Puffback** y **Lühder's Bushshrike**. Especialmente llamativa resultó también la presencia de dos impresionantes **White-necked Raven**, cuya gran envergadura y característica coloración los hacían destacar entre las aves que sobrevolaban el bosque.

A medida que avanzábamos por el camino, fuimos descubriendo otros pequeños habitantes de este extraordinario ecosistema, entre ellos **White-tailed Blue Flycatcher**, **Green Crombec**, **Red-tailed Greenbul**, **Yellow-whiskered Greenbul**, **African Dusky Flycatcher** y **Gray-winged Robin-Chat**, además de otras muchas especies que se movían entre los diferentes estratos de la vegetación.

Los suimangas también tuvieron un protagonismo especial durante nuestra caminata, con observaciones de **Little Green Sunbird**, **Gray-chinned Sunbird** y **Northern Double-collared Sunbird**, tres especies que contribuyeron a enriquecer todavía más nuestra lista. Finalmente, completamos esta magnífica selección con **Brown-capped Weaver**, **White-breasted Nigrita**, **Cape Wagtail** y **Streaky Seedeater**, entre otras aves.

De este modo, nuestra primera toma de contacto con los bosques de Bwindi resultó extraordinariamente productiva, permitiéndonos descubrir una avifauna muy diferente a la que habíamos observado durante los días anteriores. Una excelente bienvenida a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Uganda, donde todavía nos esperaban algunas de las experiencias más emocionantes de todo nuestro viaje.



African Emerald Cuckoo en el PN de Bwindi ©Ferran López



Grupo en la entrada del PN de Bwindi ©Ferran López

Después de disfrutar de un buen almuerzo y recuperar fuerzas, decidimos continuar nuestra exploración ornitológica por otro sector del bosque de Bwindi, esta vez siguiendo un camino cercano al río, donde la exuberante vegetación y la elevada humedad creaban unas condiciones ideales para numerosas especies de aves forestales.

La actividad ornitológica volvió a ser intensa y pronto conseguimos ampliar nuestra lista con nuevas e interesantes observaciones de **Yellow-spotted Barbet**, **Black-tailed Oriole**, **African Shrike-flycatcher**, **Gray-green Bushshrike** y **Buff-throated Apalis**. También conseguimos escuchar el característico reclamo de un **Yellow-whiskered Greenbul**, aunque en esta ocasión no logramos localizarlo visualmente entre la densa vegetación.

A medida que avanzábamos por este magnífico entorno natural, continuaron apareciendo otras especies características del bosque húmedo, como **Plain Greenbul**, **Narrow-tailed Starling**, **Rufous Flycatcher-Thrush**, **White-tailed Ant-Thrush** y el espectacular **Snowy-crowned Robin-Chat**,

entre otras aves que contribuyeron a hacer de esta caminata una experiencia especialmente productiva.

Finalmente, cuando las últimas luces del día comenzaban a desaparecer entre las copas de los enormes árboles, emprendimos el camino de regreso a nuestro alojamiento, plenamente satisfechos después de una jornada extraordinaria y de nuestro primer contacto con la impresionante biodiversidad del Parque Nacional de Bwindi Impenetrable.

Ya en nuestro lodge, disfrutamos de una agradable cena y dedicamos un buen rato a repasar y completar nuestra extensa lista diaria de aves, recordando las numerosas observaciones realizadas a lo largo del día y repasar alguna de las cosas que haríamos al día siguiente. Finalmente, nos retiramos a nuestras habitaciones para disfrutar de un merecido descanso, con la ilusión de seguir descubriendo al día siguiente los extraordinarios tesoros naturales que esconde este fascinante bosque tropical y sobre todo, nuestra visita a los Gorilas de montaña.

Día 11 – Parque Nacional Bwindi y visita a los Gorilas de Montaña

¡Por fin había llegado uno de los días más esperados y emocionantes de todo nuestro viaje por Uganda! Después de varias jornadas disfrutando de una extraordinaria diversidad de aves y mamíferos, había llegado el momento de vivir una de las experiencias más especiales que puede ofrecer la naturaleza africana: **el encuentro con los gorilas de montaña en el Parque Nacional de Bwindi Impenetrable**.

Tras desayunar en nuestro alojamiento, nos desplazamos a pie hasta el gran centro de

visitantes del parque nacional, situado en Buhoma, donde nos reunimos con el resto de participantes que aquella mañana también iban a realizar esta inolvidable actividad. Una vez allí, nos acomodamos en las sillas dispuestas frente a un pequeño escenario, donde comenzó una agradable ceremonia de bienvenida.

En primer lugar, un grupo de mujeres de la comunidad local de Buhoma nos recibió con una animada exhibición de bailes y canciones tradicionales, transmitiéndonos

toda la alegría y hospitalidad de sus gentes. Incluso nos invitaron a participar en algunos de los bailes, aunque, como era de esperar, ¡nuestras habilidades no pudieron ser contempladas por el resto!

Después de este divertido comienzo, los responsables del parque nacional nos ofrecieron una interesante explicación sobre el desarrollo de la actividad, las normas de comportamiento y las medidas de seguridad que debíamos respetar durante nuestro encuentro con los gorilas. También nos explicaron cómo se organizaban los diferentes grupos de visitantes y su distribución entre las familias de gorilas habituadas a la presencia humana.

Mediante un sorteo, nos asignaron uno de estos grupos familiares y, acompañados por varios guardas y guías del parque, subimos nuevamente a nuestros vehículos para desplazarnos hacia las zonas más elevadas de las montañas, donde comenzaríamos nuestra búsqueda.

Una vez alcanzado el punto de partida, iniciamos una caminata de unos 15 minutos que nos condujo hasta el límite de una plantación, justo donde comenzaba la densa vegetación del bosque tropical. Allí tuvimos que detenernos y esperar mientras los rastreadores continuaban buscando al grupo familiar que nos habían asignado. La emoción y los nervios eran enormes, conscientes de que estábamos a punto de vivir uno de los momentos más especiales de nuestro viaje.

Después de un rato de espera que se nos hizo eterno, finalmente llegó la noticia que todos deseábamos escuchar: ¡los guardas habían conseguido localizar a nuestra familia de gorilas!

Sin perder tiempo, comenzamos a avanzar por un estrecho sendero que se adentraba en el bosque, siguiendo las indicaciones de nuestros guías. El terreno era húmedo, la

vegetación exuberante y cada paso aumentaba nuestra expectación. Tras unos 20 minutos de caminata, durante los cuales tuvimos que cruzar un pequeño riachuelo, llegó por fin el momento que tanto habíamos esperado.

¡Ante nuestros ojos aparecieron los primeros gorilas de montaña!

Se trataba de dos ejemplares jóvenes que se desplazaban tranquilamente entre la vegetación. Apenas podíamos creer que finalmente los tuviéramos delante. Siguiendo cuidadosamente sus movimientos y acompañados en todo momento por nuestros guías, conseguimos llegar hasta el resto del grupo familiar.

Allí nos esperaba una escena verdaderamente extraordinaria: un impresionante macho de espalda plateada, que dominaba el grupo con su imponente presencia, una hembra adulta acompañada de una cría de apenas unos días de vida y al menos seis o siete ejemplares jóvenes de diferentes edades.

La emoción era difícil de describir. Después de tantos meses preparando nuestro viaje, por fin estábamos contemplando a estos magníficos primates en su propio hábitat, observando su comportamiento natural y descubriendo de primera mano la sorprendente semejanza de muchos de sus gestos y expresiones con los nuestros.

Pero todavía nos esperaba una sorpresa aún mayor. Poco después de nuestro encuentro inicial, todo el grupo familiar comenzó a desplazarse lentamente y, tras recorrer unos pocos metros, salió de la espesura del bosque hasta alcanzar una zona mucho más abierta. Aquello nos brindó unas condiciones de observación realmente excepcionales, permitiéndonos disfrutar de una hora completa junto a toda la familia de gorilas.

Durante aquellos 60 minutos, que parecieron transcurrir en apenas unos

instantes, pudimos contemplar absolutamente todos los detalles de su comportamiento: sus movimientos pausados, las interacciones entre los jóvenes, las miradas, los gestos, las expresiones de sus rostros y la delicadeza con la que la hembra cuidaba de su diminuta cría.

En algunos momentos, fueron los propios gorilas quienes se aproximaron espontáneamente hasta situarse a escasos centímetros de nosotros, llegando incluso a pasar a apenas medio metro de distancia. La proximidad era tan extraordinaria que resultaba prácticamente imposible utilizar nuestras cámaras fotográficas con objetivos largos, por lo que en la mayoría de las ocasiones tuvimos que recurrir a nuestros teléfonos móviles para intentar inmortalizar aquellos instantes.

Sin embargo, más allá de las fotografías, lo verdaderamente importante era disfrutar de cada segundo de aquel encuentro. Estar tan cerca de estos impresionantes animales, observar sus relaciones familiares y contemplar sus expresiones en absoluta libertad fue una experiencia difícil de transmitir con palabras.

Sin duda, uno de los momentos más emocionantes, intensos e inolvidables de todo nuestro viaje por Uganda. Una experiencia que superó nuestras expectativas y que permanecerá para siempre en nuestra memoria. Poder contemplar a los gorilas de montaña en su hábitat natural es un privilegio extraordinario y, probablemente, una de las vivencias más fascinantes que cualquier amante de la naturaleza puede experimentar al menos una vez en su vida.



Gorila macho de espalda plateada en el PN de Bwindi ©Mireia P. Martos



Hembra de gorila de montaña en el PN de Bwindi ©Mireia P. Martos



Grupo tras ver los gorilas de montaña en el PN de Bwindi ©Ferran López

Pero nuestra jornada todavía estaba lejos de terminar. Después de la extraordinaria e inolvidable experiencia vivida con los gorilas de montaña, regresamos a nuestro alojamiento para disfrutar de un merecido almuerzo y recuperar fuerzas. Sin embargo, todavía nos quedaban algunas horas de luz y no queríamos desaprovechar la oportunidad de seguir descubriendo la extraordinaria riqueza ornitológica del Parque Nacional de Bwindi Impenetrable.

Así pues, volvimos a subir a nuestros vehículos para dirigirnos hacia las zonas más elevadas de las montañas de Bwindi, donde comenzamos a explorar una pista forestal rodeada de una exuberante vegetación tropical. La actividad ornitológica no tardó en dar sus frutos y, al poco de iniciar nuestro recorrido, conseguimos localizar otra de las especies más espectaculares y deseadas de nuestro viaje: ¡el magnífico **Black Bee-eater**! Su extraordinaria combinación de colores y su elegante silueta nos brindaron una observación realmente memorable, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la tarde.

Pero las sorpresas no terminaron aquí. A medida que avanzábamos por la pista forestal, continuamos disfrutando de excelentes observaciones de **Great Blue Turaco**, **Black-billed Turaco**, **Yellow-spotted Barbet**, **Western Black-headed Oriole** y nuevos ejemplares de **Lühder's Bushshrike**. También conseguimos localizar **Banded Prinia**, **Ansorge's Greenbul**, **Red-faced Woodland-Warbler**, hasta cuatro **Narrow-tailed Starling**, **Purple-headed Starling** y **Equatorial Akalat**, entre otras especies características de estos magníficos bosques de montaña.

Posteriormente, volvimos a subir a nuestros vehículos para desplazarnos hasta otro sector de la misma pista, donde realizamos una nueva parada que resultó igualmente productiva. Allí conseguimos ampliar nuestra lista con **Eastern Yellow-billed**

Barbet, **Sharpe's Starling**, **African Dusky Flycatcher**, **Collared Sunbird**, **Northern Double-collared Sunbird** y el espectacular **Regal Sunbird**, una auténtica joya de los bosques montanos africanos por su extraordinaria coloración. Además también conseguimos ver el **Cercopiteco de L'Hoest**, un endemismo de la región del Rift Albertino y áreas próximas, y también el **Duíquero de Ruwenzori**, otro endemismo de las montañas Ruwenzori.

Completamos esta magnífica selección de aves con **Black-crowned Waxbill** y un interesante **Oriole Finch**, poniendo así el broche de oro a una tarde de observaciones que, por sí sola, ya habría justificado una excelente jornada ornitológica.

Finalmente, cuando las últimas luces del día comenzaban a desaparecer entre las montañas de Bwindi, emprendimos el camino de regreso a nuestro lodge, plenamente satisfechos después de una jornada que difícilmente podríamos olvidar.

Ya en nuestro alojamiento, disfrutamos de una agradable cena y dedicamos un buen rato a repasar nuestra extensa lista diaria de aves. Sin embargo, aquella noche nuestras conversaciones giraron inevitablemente alrededor de los extraordinarios momentos que habíamos vivido durante la mañana junto a los gorilas de montaña. Sus miradas, sus gestos, sus movimientos y, sobre todo, la increíble sensación de haber compartido unos instantes de sus vidas en plena libertad seguían muy presentes en nuestra memoria.

Finalmente, nos retiramos a nuestras habitaciones para descansar, todavía emocionados y con la sensación de haber vivido **una de las experiencias más extraordinarias e inolvidables de nuestras vidas**. Una de esas jornadas que permanecerán para siempre en nuestros recuerdos y que, sin duda, representan la esencia de cualquier gran viaje de naturaleza.



Great Blue Turaco, Eastern Yellow-billed Barbet, Duíquero de Ruwenzori, Cercopiteco de L'Hoest y Black Bee-eater en las montañas del PN de Bwindi ©Ferran López

Día 12 – Parque Nacional Bwindi y lago Bunyonyi

Nos levantamos temprano, preparados para afrontar otra jornada que prometía ser memorable en las espectaculares montañas del **Parque Nacional de Bwindi Impenetrable**. Después de la inolvidable experiencia vivida el día anterior con los gorilas de montaña, esta vez nuestro principal objetivo era completamente diferente, aunque igualmente emocionante desde el punto de vista ornitológico: intentar localizar una de las aves más raras, singulares y deseadas de todo nuestro viaje, el extraordinario **Grauer's Broadbill**.

Se trata de una de las especies más peculiares y escasas del continente africano, además de ser el único representante del género *Pseudocalyptomena*. Su distribución mundial está restringida a los bosques montanos del Rift Albertino, concretamente a determinadas áreas de la República Democrática del Congo y del suroeste de Uganda. Esta distribución tan limitada, unida a la dificultad de localizarlo en su hábitat natural, lo convierte en una auténtica joya ornitológica y en uno de los grandes objetivos de cualquier viaje especializado a esta región de África.

Así pues, después de desayunar en nuestro alojamiento, nos dispusimos a realizar una larga caminata por uno de los senderos que se adentran en las laderas boscosas de Bwindi. En esta ocasión contamos también con la inestimable ayuda de un buen amigo y guía local, cuyo conocimiento del terreno y de las aves de la zona resultaría fundamental para intentar encontrar nuestra especie objetivo.

Desde los primeros momentos de la caminata, la actividad ornitológica fue extraordinaria. Apenas habíamos comenzado a descender cuando empezaron a aparecer algunas de las especies más

características de estos bosques montanos, como **Rameron Pigeon, Mountain Buzzard, White-headed Woodhoopoe, Eastern Yellow-billed Barbet, Black-tailed Oriole, Chinspot Batis** y **White-bellied Crested Flycatcher**.

A medida que avanzábamos por el sendero, rodeados de una vegetación exuberante y de enormes árboles cubiertos de musgos y epífitas, continuamos sumando nuevas observaciones de gran interés. Entre ellas destacaron **Stripe-breasted Tit, Rwenzori Apalis, Chubb's Cisticola, Kikuyu Mountain Greenbul, Yellow-whiskered Greenbul, Yellow-streaked Greenbul** y **Rwenzori Hill Babbler**, una magnífica representación de la avifauna característica de las montañas del Rift Albertino.

La jornada continuó ofreciéndonos excelentes oportunidades para observar otras especies igualmente interesantes, como **Yellow-eyed Black-Flycatcher, Strange Weaver**, el precioso **Dusky Crimsonwing, Oriole Finch** y **Western Citril**. Sin embargo, por muchas aves que fuéramos encontrando, todos teníamos en mente el mismo objetivo y seguíamos avanzando con la esperanza de que, en cualquier momento, apareciera nuestro ansiado **Grauer's Broadbill**.

Y finalmente, después de una intensa búsqueda, ¡llegó uno de los momentos más emocionantes de todo nuestro viaje!

¡Conseguimos localizar una pareja de **Grauer's Broadbill**!

La emoción fue enorme. Ante nosotros teníamos nada menos que dos ejemplares de una de las aves más extraordinarias y difíciles de observar de África. Su inconfundible aspecto, su llamativa coloración verde y su peculiar silueta nos permitieron disfrutar de una observación

que llevábamos mucho tiempo soñando con conseguir.



Grauer's Broadbill, Black-billed Turaco y Rameron Pigeon en las montañas del PN de Bwindi ©Ferran López

Después de recuperar un poco las fuerzas tras la intensa caminata y todavía emocionados por la extraordinaria observación de la pareja de **Grauer's Broadbill**, regresamos a nuestros vehículos para continuar nuestro recorrido en dirección sur, atravesando los espectaculares paisajes montañosos de Bwindi.

Durante el trayecto decidimos realizar una nueva parada en otro sector del bosque, con la intención de seguir explorando su extraordinaria riqueza ornitológica. Una vez más, la elección resultó muy acertada, ya que pronto comenzamos a localizar nuevas especies de gran interés, como **White-eyed Slaty-Flycatcher**, **Dwarf Honeyguide**,

Petit's Cuckooshrike, dos ejemplares de **Rwenzori Batis** y **White-browed Crombec**.

También conseguimos escuchar los característicos reclamos de **Black-throated Apalis** y **Chestnut-throated Apalis**, aunque en esta ocasión ambas especies permanecieron ocultas entre la densa vegetación. Afortunadamente, sí pudimos observar **Masked Apalis**, otra interesante especie característica de estos bosques montanos.

La parada continuó ofreciéndonos buenas observaciones de **Mountain Yellow-Warbler**, **Abyssinian Thrush** y nuevamente **Western Citril**, completando así una excelente selección de aves propias de las zonas altas del Rift Albertino.



Parte del grupo fotografiando sin parar en el PN de Bwindi ©Ferran López

Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, el cielo comenzó a cubrirse y las primeras gotas de lluvia hicieron acto de presencia. Poco a poco, las precipitaciones fueron ganando intensidad, por lo que decidimos dar por finalizada nuestra exploración de los bosques montanos de Bwindi y continuar nuestro recorrido hacia un nuevo objetivo ornitológico que nos hacía especial ilusión: **African Pitta**.

Después de haber conseguido observar la extraordinaria **Green-breasted Pitta** durante nuestra estancia en el Parque Nacional de Kibale, teníamos ahora la oportunidad de intentar localizar una segunda especie de esta fascinante familia de aves, una de las más deseadas por los observadores de aves de todo el mundo.

Para ello, nos desplazamos hasta el espectacular lago Bunyonyi, rodeado de verdes colinas y salpicado de numerosas islas. Allí tuvimos que embarcarnos para alcanzar una de estas pequeñas islas, donde

nos esperaba una nueva aventura ornitológica.

Una vez desembarcamos, iniciamos una breve caminata de apenas unos minutos hasta llegar a uno de los territorios conocidos de la especie. Y, una vez más, conseguimos localizar y disfrutar de una magnífica observación de **African Pitta**, convirtiéndose así en nuestra segunda especie de pitta del viaje. Un encuentro realmente especial que nos permitió contemplar otra de las aves más espectaculares y codiciadas de los bosques africanos.

Con este nuevo objetivo conseguido, y todavía emocionados por las extraordinarias observaciones de aquella jornada, retomamos nuestro recorrido durante las últimas horas de la tarde hasta alcanzar nuestro nuevo alojamiento.

Finalmente, después de un día especialmente intenso, disfrutamos de una agradable cena y de un merecido descanso,

recordando los magníficos momentos vividos entre los bosques de Bwindi y las islas del lago Bunyonyi. Sin duda, una jornada excepcional en la que habíamos

conseguido observar dos de las grandes joyas ornitológicas de Uganda: Grauer's Broadbill y African Pitta.



African Pitta en el lago Bunyonyi ©Ferran López

Día 13 – Kabale y traslado hacia el Parque Nacional de Mburo

Después de disfrutar de un buen desayuno en nuestro alojamiento de Kabale, reemprendimos nuestro recorrido en dirección al **Parque Nacional del Lago Mburo**, una nueva etapa de nuestro viaje por Uganda que nos permitiría descubrir otros paisajes y seguir ampliando nuestra ya extensa lista de aves observadas.

Como venía siendo habitual durante nuestros desplazamientos, aprovechamos el trayecto para realizar diversas paradas en aquellos lugares que nos parecían especialmente interesantes desde el punto de vista ornitológico. Una vez más, estas

pequeñas prospecciones resultaron muy productivas y nos permitieron disfrutar de nuevas observaciones, entre las que destacó un magnífico **White-necked Raven** que pudimos contemplar tranquilamente mientras permanecía posado.

También conseguimos escuchar el característico canto de **Papyrus Gonolek**, una de las especies más interesantes de los humedales de esta región, además de observar **Highland Rush Warbler**, **African Stonechat**, **Bare-faced Go-away-bird**, **African Harrier-Hawk**, **Cinnamon-chested Bee-eater**, **Greater Swamp Warbler** y **Dark**

Chanting-Goshawk, entre otras aves que fueron apareciendo a lo largo de nuestro recorrido.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas de la jornada todavía estaba por llegar. Antes de alcanzar nuestro destino, decidimos desviarnos hacia un último enclave donde teníamos la esperanza de encontrar algunas especies especialmente interesantes de aves nocturnas.

La parada en Rwakobo Rock Lodge resultó extraordinaria, ya que conseguimos localizar nada menos que tres especies diferentes de chotacabras: **Fiery-necked Nightjar**, dos ejemplares de **Freckled Nightjar** y hasta tres **Slender-tailed**

Nightjar. Una magnífica selección de estas enigmáticas aves, que se convirtió en uno de los momentos ornitológicos más destacados del día.

Además, durante esta última prospección también conseguimos observar nuevamente **Klaas's Cuckoo** y **Bateleur**, pero la sorpresa no fue exclusivamente ornitológica. Para completar la jornada, tuvimos la enorme fortuna de encontrarnos con una impresionante **Pitón de Seba** o también conocida como **Pitón Africana de Roca** de grandes dimensiones, otro de esos encuentros inesperados que hacen tan fascinantes los viajes de naturaleza por el continente africano.



Pitón de Seba, Slender-tailed Nightjar y Freckled Nightjar en el PN de Mburo ©Ferran López

Una vez nos adentramos en el Parque Nacional del Lago Mburo, comenzamos a disfrutar de nuevas observaciones ornitológicas mientras recorríamos sus paisajes de sabana arbolada. Entre las primeras especies que conseguimos

localizar destacaron **Common Scimitarbill**, **Lesser Masked-Weaver** y, especialmente, dos impresionantes **Lappet-faced Vulture**, que tuvimos la enorme suerte de observar a muy corta distancia, pudiendo apreciar

todos los detalles de estas magníficas rapaces carroñeras.

Continuamos nuestro recorrido hasta alcanzar el embarcadero del lago Mburo, donde nos esperaba una nueva actividad que prometía ser uno de los momentos más interesantes de la jornada. Una vez a bordo de nuestra embarcación, iniciamos una tranquila navegación siguiendo las orillas del lago, explorando especialmente aquellos sectores con abundante vegetación ribereña, donde esperábamos encontrar algunas de las especies más características de este ecosistema.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes objetivos de esta excursión era el extraordinario **African Finfoot**, una de las aves acuáticas más singulares y difíciles de observar de África. Se trata de una especie muy discreta, estrechamente ligada a las orillas de ríos y lagos con vegetación densa, donde suele desplazarse sigilosamente entre las ramas y raíces que sobresalen del agua.

¡Y nuestra suerte fue extraordinaria! Durante el recorrido conseguimos observar nada menos que cinco ejemplares

diferentes de **African Finfoot**, una cifra realmente excepcional que nos permitió disfrutar ampliamente de esta fascinante especie y convertirla en una de las grandes protagonistas de nuestra visita al lago Mburo.

La navegación también nos brindó excelentes oportunidades para observar otras aves acuáticas y de ribera, como **Black Crake**, **Water Thick-knee**, **Malachite Kingfisher**, **Woodland Kingfisher**, **Angola Swallow** y **White-browed Robin-Chat**, entre otras especies que fueron apareciendo a medida que avanzábamos por las tranquilas aguas del lago.

Pero la fauna del lago Mburo no se limitaba únicamente a las aves. Durante nuestra excursión también pudimos contemplar numerosos **hipopótamos**, algunos de ellos descansando parcialmente sumergidos, así como varios **cocodrilos del Nilo**. Especialmente interesante resultó la observación de uno de estos grandes reptiles en la orilla exterior del lago, aparentemente dedicado a la incubación o vigilancia de su puesta.



African Finfoot en el PN de Muro ©Ferran López

Dedicamos el resto de la tarde a recorrer con nuestros vehículos los diferentes caminos y pistas del Parque Nacional del Lago Mburo, explorando sus extensas sabanas arboladas y los sectores de vegetación más densa, siempre atentos a cualquier movimiento que pudiera delatar la presencia de nuevas especies de aves o mamíferos.

La actividad ornitológica volvió a ser muy intensa y pronto comenzamos a disfrutar de nuevas observaciones de **Red-necked Spurfowl**, **Bare-faced Go-away-bird** y **African Gray Hornbill**, además de un espectacular **Lilac-breasted Roller**, una de las aves más coloridas y llamativas de las sabanas africanas.

Entre las especies más interesantes de la tarde también destacaron **Crested Barbet**, **Spot-flanked Barbet** y, especialmente, dos inesperados **Black-collared Barbet**, cuya

observación supuso una magnífica sorpresa. Continuamos ampliando nuestra lista con **Yellow-breasted Apalis**, **Greater Blue-eared Starling**, **Brown-backed Scrub-Robin**, **Emerald-spotted Wood-Dove**, **Meyer's Parrot**, **Striped Kingfisher**, **Tabora Cisticola**, **Little Sparrowhawk** y **Brown-chested Lapwing**, entre otras muchas aves que fueron apareciendo a lo largo de nuestro recorrido.

Pero, como suele ocurrir en los grandes espacios naturales de Uganda, las aves compartieron protagonismo con los mamíferos. Durante nuestro safari también pudimos contemplar diversos grupos de **impalas**, **jirafas**, varios **facóqueros**, **topis** y magníficos ejemplares de **eland común**, el antílope de mayor tamaño de África. Todos ellos contribuyeron a enriquecer todavía más una tarde que nos permitió disfrutar plenamente de los paisajes y de la extraordinaria biodiversidad del parque.



Lilac-breasted Roller en el PN de Muro ©Ferran López

Día 14 – Parque Nacional Mburo y traslado al aeropuerto de Entebbe

Iniciamos nuestra última mañana en Uganda con una mezcla de satisfacción y nostalgia, conscientes de que nuestro extraordinario viaje estaba llegando a su fin. Sin embargo, todavía disponíamos de algunas horas para seguir disfrutando de la avifauna del país, por lo que decidimos dedicar la primera parte de la jornada a realizar una breve prospección por el sector norte del Parque Nacional del Lago Mburo, antes de emprender nuestro regreso hacia Entebbe.

Como ya venía siendo habitual durante todo el viaje, la actividad ornitológica comenzó desde los primeros momentos. Pronto conseguimos localizar tres **Coqui Francolin**, una especie especialmente interesante que nos brindó una magnífica observación. También disfrutamos de nuevos encuentros con **African Gray Hornbill**, **Woodland Kingfisher**, **Crested Barbet**, **Gray-backed Fiscal**, **Northern Fiscal** y **Greater Blue-eared Starling**, entre otras aves que todavía seguían enriqueciendo nuestra extensa lista de especies observadas en Uganda.

Una vez abandonamos el parque nacional, continuamos nuestro recorrido en dirección norte, aprovechando el trayecto para realizar algunas últimas paradas en aquellos enclaves que nos parecían más interesantes. En una de ellas, junto a una zona de marismas, nos llevamos una agradable sorpresa al descubrir nada menos que tres **Rufous-bellied Heron**, acompañadas de **Gray Crowned Crane** y **African Sacred Ibis**, tres especies que nos permitieron seguir disfrutando de la extraordinaria diversidad de aves acuáticas de este país.

Algo más adelante alcanzamos las conocidas marismas de Kaku Swamp, donde decidimos realizar nuestra última prospección ornitológica del viaje. Una vez

más, el humedal no nos decepcionó y conseguimos observar cuatro **White-faced Whistling-Duck**, tres **Spur-winged Goose**, nuevos ejemplares de **Bare-faced Go-away-bird** y tres **African Swampphen**, entre otras especies.

Sin embargo, todavía nos esperaba una última y extraordinaria sorpresa: ¡otro **Shoebill**!

Después de haber disfrutado de una de las observaciones más memorables de nuestro viaje durante la visita a los pantanos de Mabamba, encontrarnos nuevamente con esta especie tan emblemática fue una manera excepcional de despedirnos de Uganda. Su inconfundible silueta y su aspecto casi prehistórico volvieron a dejarnos fascinados, recordándonos por qué se trata de una de las aves más extraordinarias y deseadas del continente africano.

Con esta última gran observación dimos por finalizadas nuestras actividades ornitológicas y emprendimos ya el trayecto directo hacia el Aeropuerto Internacional de Entebbe, donde había llegado el momento de despedirnos de nuestros guías y conductores, que nos habían acompañado durante toda esta inolvidable aventura.

Fueron momentos de agradecimiento y también de cierta tristeza, después de tantos días compartiendo experiencias, emociones, largas jornadas de campo y encuentros extraordinarios con la fauna africana. Su profesionalidad, conocimiento del terreno y entusiasmo habían sido fundamentales para el éxito de nuestro viaje.

De este modo, pusimos punto final a una expedición verdaderamente inolvidable por Uganda, durante la cual habíamos recorrido algunos de los espacios naturales más

espectaculares del país, desde las extensas sabanas de Murchison Falls y Queen Elizabeth hasta los extraordinarios bosques

tropicales de Kibale y Bwindi, pasando por los humedales de Mabamba, el canal de Kazinga y el lago Mburo.



Grupo casi al completo en el turístico punto del ecuador ©Ferran López

Lista total de aves detectadas

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata*

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*

Yellow-billed Duck *Anas undulata*

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*

Crested Francolin *Dendroperdix sephaena*

Coqui Francolin *Scleroptila coqui*

Common Quail *Coturnix coturnix*

Harlequin Quail *Coturnix delegorguei*

Scaly Spurfowl *Pternistis squamatus*

Heuglin's Spurfowl *Pternistis icterorhynchus*

Red-necked Spurfowl *Pternistis afer*

Rock Pigeon *Columba livia*

Speckled Pigeon *Columba guinea*

Rameron Pigeon *Columba arquatrix*

Mourning Collared-Dove *Streptopelia decipiens*

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola*

Vinaceous Dove *Streptopelia vinacea*

Laughing Dove *Spilopelia senegalensis*

Emerald-spotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos*

Black-billed Wood-Dove *Turtur abyssinicus*


Blue-spotted Wood-Dove *Turtur afer*

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*

Namaqua Dove *Oena capensis*

African Green-Pigeon *Treron calvus*

Denham's Bustard *Neotis denhami*



Denham's Bustard en el PJN de Murchinson Falls ©Ferran López



African Green-Pigeon en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López

Black-bellied Bustard *Lissotis melanogaster*

Great Blue Turaco *Corythaeola cristata*

Bare-faced Go-away-bird *Crinifer personatus*

Eastern Plantain-eater *Crinifer zonurus*

Ross's Turaco *Musophaga rossae*

Black-billed Turaco *Tauraco schuettii*

Blue-headed Coucal *Centropus monachus*

White-browed Coucal *Centropus superciliosus*

Blue Malkoha *Ceuthmochares aereus*

Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti*

Dideric Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*

Dusky Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx mehowi*

Black Cuckoo *Cuculus clamosus*

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*

African Cuckoo *Cuculus gularis*

Fiery-necked Nightjar *Caprimulgus pectoralis*

Swamp Nightjar *Caprimulgus natalensis*

Freckled Nightjar *Caprimulgus tristigma*

Slender-tailed Nightjar *Caprimulgus clarus*

Sabine's Spinetail *Rhaphidura sabini*

Alpine Swift *Tachymarptis melba*

Common Swift *Apus apus*

Little Swift *Apus affinis*

Horus Swift *Apus horus*

White-rumped Swift *Apus caffer*

African Palm Swift *Cypsiurus parvus*

African Crane *Crex egregia*

Eurasian Moorhen *Gallinula chloropus*

African Swampphen *Porphyrio madagascariensis*

Black Crane *Zapornia flavirostra*

African Finfoot *Podica senegalensis*

Gray Crowned-Crane *Balearica regulorum*



Gray Crowned Crane en el PN de Murchinson Falls ©Ferran López

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus*

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis*

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris*

Long-toed Lapwing *Vanellus crassirostris*

Spur-winged Lapwing *Vanellus spinosus*

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus*

Senegal Lapwing *Vanellus lugubris*

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus*

Wattled Lapwing *Vanellus senegallus*

Brown-chested Lapwing *Vanellus superciliosus*

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius*

African Jacana *Actophilornis africanus*

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Common Greenshank *Tringa nebularia*

Small Buttonquail *Turnix sylvaticus*



Small Buttonquail en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López

Temminck's Courser *Cursorius temminckii*

Rock Pratincole *Glareola nuchalis*

Collared Pratincole *Glareola pratincola*

Gray-hooded Gull *Chroicocephalus cirrocephalus*

African Skimmer *Rynchops flavirostris*

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*

Caspian Tern *Hydroprogne caspia*

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*

Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor*

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

African Openbill *Anastomus lamelligerus*

African Woolly-necked Stork *Ciconia microscelis*

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis*

Marabou Stork *Leptoptilos crumenifer*

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*

African Darter *Anhinga rufa*

Reed Cormorant *Microcarbo africanus*

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*

African Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash*

African Spoonbill *Platalea alba*

Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax*

Little Egret *Egretta garzetta*

Little Heron *Butorides striata*

Rufous-bellied Heron *Ardeola rufiventris*

Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Western Cattle-Egret *Bubulcus ibis*

Great Egret *Ardea alba*

Yellow-billed Egret *Ardea brachyrhyncha*

Gray Heron *Ardea cinerea*

Purple Heron *Ardea purpurea*

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

Goliath Heron *Ardea goliath*

Hamerkop *Scopus umbretta*



Goliath Heron en Mabamba Swamp ©Ferran López



Hamerkop en el PN de Mburo ©Ferran López

Shoebill *Balaeniceps rex*

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*

Black-winged Kite *Elanus caeruleus*

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus*

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis*

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotos*

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

White-backed Vulture *Gyps africanus*

Rüppell's Griffon *Gyps rueppelli*

Bateleur *Terathopius ecaudatus*



White-headed Vulture en el PN de Queem Elizabeth y Bateleur en el PN de Mburo ©Ferran López

Western Banded Snake-Eagle *Circaetus cinerascens*

Black-chested Snake-Eagle *Circaetus pectoralis*

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus*

Crowned Eagle *Stephanoaetus coronatus*

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*



Martial Eagle en el PN de Murchinson Falls ©Mireia P. Martos

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis*

Wahlberg's Eagle *Hieraaetus wahlbergi*

Tawny Eagle *Aquila rapax*

Bat Hawk *Macheiramphus alcinus*

Gabar Goshawk *Micronisus gabar*

Dark Chanting-Goshawk *Melierax metabates*

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus*

Little Sparrowhawk *Accipiter minullus*

Shikra *Accipiter badius*

Black Goshawk *Accipiter melanoleucus*

African Marsh Harrier *Circus ranivorus*

Black Kite *Milvus migrans*

African Fish-Eagle *Ichthyophaga vocifer*

Augur Buzzard *Buteo augur*

Mountain Buzzard *Buteo oreophilus*

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*

African Wood-Owl *Strix woodfordii*

Speckled Mousebird *Colius striatus*

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus*

Narina Trogon *Apaloderma narina*

Common Hoopoe *Upupa epops*

Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus*

White-headed Woodhoopoe *Phoeniculus bollei*

Common Scimitarbill *Rhinopomastus cyanomelas*



Narina Trogon en el PN de Kibale ©Ferran López

Abyssinian Ground-Hornbill *Bucorvus abyssinicus*

Crowned Hornbill *Lophoceros alboterminatus*

African Gray Hornbill *Lophoceros nasutus*

Black-and-white-casqued Hornbill *Bycanistes subcylindricus*

White-thighed Hornbill *Bycanistes albotibialis*

Black Bee-eater *Merops gularis*

Red-throated Bee-eater *Merops bulocki*

Little Bee-eater *Merops pusillus*

Blue-breasted Bee-eater *Merops variegatus*

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates*

Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus*

White-throated Bee-eater *Merops albicollis*

Olive Bee-eater *Merops superciliosus*

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus*



Little Bee-eater en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López

Malachite Kingfisher *Corythornis cristatus*

African Pygmy Kingfisher *Ispidina picta*

Gray-headed Kingfisher *Halcyon leucocephala*

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon malimbica*

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima*

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*



African Pygmy Kingfisher en el PN de Queen Elizabeth ©Ferran López

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus*

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*

Blue-throated Roller *Eurystomus gularis*

Eastern Yellow-billed Barbet *Trachyphonus purpuratus*

Crested Barbet *Trachyphonus vaillantii*

Speckled Tinkerbird *Pogoniulus scolopaceus*

Yellow-throated Tinkerbird *Pogoniulus subsulphureus*

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus*

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus chrysoconus*



Speckled Tinkerbird en el lago Mkuruba ©Ferran López

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchaillui*

Hairy-breasted Barbet *Tricholaema hirsuta*

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa*

White-headed Barbet *Lybius leucocephalus*

Black-billed Barbet *Lybius guifsobalito*

Black-collared Barbet *Lybius torquatus*

Double-toothed Barbet *Lybius bidentatus*

Cassin's Honeybird *Prodotiscus insignis*

Dwarf Honeyguide *Indicator pumilio*

Willcocks's Honeyguide *Indicator willcocksi*

Lesser Honeyguide *Indicator minor*

Greater Honeyguide *Indicator indicator*

Red-throated Wryneck *Jynx ruficollis*

Golden-crowned Woodpecker *Dendropicos xantholophus*

Speckle-breasted Woodpecker *Dendropicos poecilolaemus*

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens*

African Gray Woodpecker *Dendropicos goertae*

Buff-spotted Woodpecker *Pardipicus nivosus*

Fine-banded Woodpecker *Campethera tullbergi*

Nubian Woodpecker *Campethera nubica*

Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus*

Gray Kestrel *Falco ardosiaceus*

Red-necked Falcon *Falco chicquera*

African Hobby *Falco cuvierii*

Red-headed Lovebird *Agapornis pullarius*

Gray Parrot *Psittacus erithacus*

Meyer's Parrot *Poicephalus meyeri*

Grauer's Broadbill *Pseudocalyptomena graueri*

African Pitta *Pitta angolensis*

Green-breasted Pitta *Pitta reichenowi*

Black Cuckooshrike *Campephaga flava*

Petit's Cuckooshrike *Campephaga petiti*

Red-shouldered Cuckooshrike *Campephaga phoenicea*

Western Black-headed Oriole *Oriolus brachyrynchus*

African Black-headed Oriole *Oriolus larvatus*

Black-tailed Oriole *Oriolus percivali*

Chestnut Wattle-eye *Platysteira castanea*

Brown-throated Wattle-eye *Platysteira cyanea*

Rwenzori Batis *Batis diops*

Chinspot Batis *Batis molitor*

Western Black-headed Batis *Batis erlangeri*

White-crested Helmetshrike *Prionops plumatus*

African Shrike-flycatcher *Megabyas flammulatus*

Black-and-white Shrike-flycatcher *Bias musicus*

Brubru *Nilaus afer*

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis*

Pink-footed Puffback *Dryoscopus angolensis*

Marsh Tchagra *Tchagra minutus*

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegalus*

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis*

Lühder's Bushshrike *Laniarius luehderi*

Tropical Boubou *Laniarius major*

Black-headed Gonolek *Laniarius erythrogaster*



Black-headed Gonolek en el PN de Mburo ©Ferran López

Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri*

Gray-green Bushshrike *Malaconotus blanchoti*

Sulphur-breasted Bushshrike *Telophorus sulfureopectus*

Gray-headed Bushshrike *Malaconotus blanchoti*

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*

Black-headed Paradise-Flycatcher *Terpsiphone rufiventer*

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*

Gray-backed Fiscal *Lanius excubitoroides*

Mackinnon's Shrike *Lanius mackinnoni*

Northern Fiscal *Lanius humeralis*

Piapiac *Ptilostomus afer*

Pied Crow *Corvus albus*

White-necked Raven *Corvus albicollis*

Yellow-bellied Hyliota *Hyliota flavigaster*

African Blue Flycatcher *Elminia longicauda*

White-tailed Blue Flycatcher *Elminia albicauda*

White-bellied Crested Flycatcher *Elminia albiventris*

White-shouldered Black-Tit *Melaniparus guineensis*

White-winged Black-Tit *Melaniparus leucomelas*

Stripe-breasted Tit *Melaniparus fasciiventer*

Flappet Lark *Mirafr rufocinnamomea*

Rufous-naped Lark *Mirafr africana*

Red-capped Lark *Calandrella cinerea*

Western Nicator *Nicator chloris*

Green Crombec *Sylvietta virens*

White-browed Crombec *Sylvietta leucophrys*

Northern Crombec *Sylvietta brachyura*

Moustached Grass-Warbler *Melocichla mentalis*

Green-backed Eremomela *Eremomela canescens*

Red-winged Gray Warbler *Drymocichla incana*

White-chinned Prinia *Schistolais leucopogon*

Rwenzori Apalis *Oreolais ruwenzorii*

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura*

Buff-bellied Warbler *Phyllolais pulchella*

Black-throated Apalis *Apalis jacksoni*

Masked Apalis *Apalis binotata*

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida*

Buff-throated Apalis *Apalis rufogularis*

Chestnut-throated Apalis *Apalis porphyrolaema*

Gray Apalis *Apalis cinerea*

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*

Banded Prinia *Prinia bairdii*

Gray-capped Warbler *Eminia lepida*

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops*

Singing Cisticola *Cisticola cantans*

Whistling Cisticola *Cisticola lateralis*

Trilling Cisticola *Cisticola woosnami*

Chubb's Cisticola *Cisticola chubbi*

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana*

Winding Cisticola *Cisticola marginatus*

Carruthers's Cisticola *Cisticola carruthersi*

Stout Cisticola *Cisticola robustus*

Croaking Cisticola *Cisticola natalensis*

Tabora Cisticola *Cisticola angusticauda*

Siffling Cisticola *Cisticola brachypterus*

Foxy Cisticola *Cisticola troglodytes*

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*

Wing-snapping Cisticola *Cisticola ayresii*

African Yellow-Warbler *Iduna natalensis*

Mountain Yellow-Warbler *Iduna similis*

Lesser Swamp Warbler *Acrocephalus gracilirostris*

Greater Swamp Warbler *Acrocephalus rufescens*

Highland Rush Warbler *Bradypterus carpalis*

White-headed Sawwing *Psalidoprocne albiceps*

Black Sawwing *Psalidoprocne pristoptera*

Red-throated Crag-Martin *Ptyonoprogne rufigula*

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Angola Swallow *Hirundo angolensis*

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*

African Red-rumped Swallow *Cecropis melanocrissus*

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica*

Mosque Swallow *Cecropis senegalensis*

Slender-billed Greenbul *Stelgidillas gracilirostris*

Pale-throated Greenbul *Arizelocichla pallida*

Joyful Greenbul *Chlorocichla laetissima*

Honeyguide Greenbul *Baeopogon indicator*

Kikuyu Mountain Greenbul *Arizelocichla kikuyuensis*

Red-tailed Greenbul *Criniger calurus*

Little Greenbul *Eurillas virens*

Yellow-whiskered Greenbul *Eurillas latirostris*

Plain Greenbul *Eurillas curvirostris*

Ansorge's Greenbul *Eurillas ansorgei*

White-throated Greenbul *Phyllastrephus albigularis*

Yellow-streaked Greenbul *Phyllastrephus flavostriatus*

Cabanis's Greenbul *Phyllastrephus cabanisi*

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus*

Red-faced Woodland-Warbler *Phylloscopus laetus*

Green Hylia *Hylia prasina*

Rwenzori Hill Babbler *Sylvia alboterminata*

Green White-eye *Zosterops stuhlmanni*

Brown Babbler *Turdoides plebejus*

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardineii*

Black-lored Babbler *Turdoides sharpei*

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus*

Wattled Starling *Creatophora cinerea*

Violet-backed Starling *Cinnyricinclus leucogaster*

Sharpe's Starling *Pholia sharpii*

Narrow-tailed Starling *Poeoptera lugubris*

Purple-headed Starling *Hylopsar purpureiceps*

Rüppell's Starling *Lamprotornis purpuroptera*

Splendid Starling *Lamprotornis splendidus*

Lesser Blue-eared Starling *Lamprotornis chloropterus*

Greater Blue-eared Starling *Lamprotornis chalybaeus*

Bronze-tailed Starling *Lamprotornis chalcurus*

Rufous Flycatcher-Thrush *Neocossyphus fraseri*

White-tailed Ant-Thrush *Neocossyphus poensis*

Abyssinian Thrush *Turdus abyssinicus*

African Thrush *Turdus pelios*

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica*

Cassin's Flycatcher *Muscicapa cassini*

Pale Flycatcher *Melaenornis pallidus*

Gray Tit-Flycatcher *Myioparus plumbeus*

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens*

Silverbird *Melaenornis semipartitus*

Yellow-eyed Black-Flycatcher *Melaenornis ardesiacus*

Northern Black-Flycatcher *Melaenornis edolioides*

White-eyed Slaty-Flycatcher *Melaenornis fischeri*

Brown-backed Scrub-Robin *Cercotrichas hartlaubi*



Brown-backed Scrub-Robin ©Ferran López

White-browed Scrub-Robin *Cercotrichas leucophrys*

White-browed Robin-Chat *Cossypha heuglini*

Snowy-crowned Robin-Chat *Cossypha niveicapilla*

Spotted Morning-Thrush *Cichladusa guttata*

Gray-winged Robin-Chat *Cossypha polioptera*

Equatorial Akalat *Sheppardia aequatorialis*

African Stonechat *Saxicola torquatus*

Sooty Chat *Myrmecocichla nigra*

Little Green Sunbird *Deleornis axillaris*

Gray-chinned Sunbird *Deleornis rectirostris*

Collared Sunbird *Hedydipna collaris*

Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis*

Blue-throated Brown Sunbird *Cyanomitra cyanolaema*

Blue-headed Sunbird *Cyanomitra alinae*

Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea*

Green-throated Sunbird *Chalcomitra rubescens*

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis*

Bronze Sunbird *Nectarinia kilimensis*

Olive-bellied Sunbird *Cinnyris chloropygius*

Northern Double-collared Sunbird *Cinnyris reichenowi*

Regal Sunbird *Cinnyris regius*

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchellus*

Marico Sunbird *Cinnyris mariquensis*

Red-chested Sunbird *Cinnyris erythrocerus*

Superb Sunbird *Cinnyris superbus*

Variable Sunbird *Cinnyris venustus*

Copper Sunbird *Cinnyris cupreus*



Northern Double-collared Sunbird en el PN de Bwindi ©Ferran López

Speckle-fronted Weaver *Sporopipes frontalis*

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali*

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver *Plocepasser superciliosus*

Red-headed Malimbe *Malimbus rubricollis*

Baglafaecht Weaver *Ploceus baglafaecht*

Little Weaver *Ploceus luteolus*

Slender-billed Weaver *Ploceus pelzelni*

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis*
Spectacled Weaver *Ploceus ocularis*
Strange Weaver *Ploceus alienus*
Holub's Golden-Weaver *Ploceus xanthops*
Orange Weaver *Ploceus aurantius*
Northern Brown-throated Weaver *Ploceus castanops*
Lesser Masked-Weaver *Ploceus intermedius*
Vitelline Masked-Weaver *Ploceus vitellinus*
Vieillot's Black Weaver *Ploceus nigerrimus*
Village Weaver *Ploceus cucullatus*

Black-headed Weaver *Ploceus melanocephalus*
Golden-backed Weaver *Ploceus jacksoni*
Brown-capped Weaver *Ploceus insignis*
Cardinal Quelea *Quelea cardinalis*
Red-billed Quelea *Quelea quelea*
Northern Red Bishop *Euplectes franciscanus*
Southern Red Bishop *Euplectes orix*
Black-winged Bishop *Euplectes hordeaceus*
Black Bishop *Euplectes gierowii*
Yellow Bishop *Euplectes capensis*



Orange Weaver y Northern Red Bishop ©Ferran López

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus*
Yellow-mantled Widowbird *Euplectes macroura*
Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*
Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris*
Marsh Widowbird *Euplectes hartlaubi*
Grosbeak Weaver *Amblyospiza albifrons*
Bronze Mannikin *Spermestes cucullata*
Black-and-white Mannikin *Spermestes bicolor*
Dusky Crimsonwing *Cryptospiza jacksoni*
White-breasted Nigrita *Nigrita fusconotus*

Gray-headed Nigrita *Nigrita canicapillus*
Gray-headed Oliveback *Nesocharis capistrata*
Black-faced Waxbill *Brunhilda erythronotos*
Black-crowned Waxbill *Estrilda nonnula*
Fawn-breasted Waxbill *Estrilda paludicola*
Common Waxbill *Estrilda astrild*
Black-rumped Waxbill *Estrilda troglodytes*
Crimson-rumped Waxbill *Estrilda rhodopyga*
Quailfinch *Ortygospiza atricollis*
Red-cheeked Cordonbleu *Uraeginthus bengalus*
Green-winged Pytilia *Pytilia melba*
Brown Twinspot *Clytospiza monteiri*

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala*

African Firefinch *Lagonosticta rubricata*

Black-bellied Firefinch *Lagonosticta rara*

Bar-breasted Firefinch *Lagonosticta rufopicta*

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*

Village Indigobird *Vidua chalybeata*

House Sparrow *Passer domesticus*

Northern Gray-headed Sparrow *Passer griseus*

Cape Wagtail *Motacilla capensis*

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp*

African Pipit *Anthus cinnamomeus*

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys*

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*

Oriole Finch *Linurgus olivaceus*

White-rumped Seedeater *Crithagra leucopygia*

Yellow-fronted Canary *Crithagra mozambica*

Western Citril *Crithagra frontalis*

Brimstone Canary *Crithagra sulphurata*

Streaky Seedeater *Crithagra striolata*

Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris*

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi*