



NORTE DEL PERÚ

Marañón, Abra Patricia, Plataforma y Cajamarca

Julio 2026

ICARO BIRDING EXPERIENCE

Introducción



Entre el 11 y el 25 de julio de 2026 recorrimos el norte del Perú siguiendo una ruta diseñada para explorar algunos de los ambientes con mayor diversidad y endemismo de aves del país. Durante 15 días viajamos desde los bosques secos y humedales costeros de la región de Lambayeque hasta los bosques montanos, selvas de piedemonte y valles interandinos de Amazonas, San Martín y Cajamarca, atravesando un gradiente altitudinal que nos llevó prácticamente desde el nivel del mar hasta cerca de los 4.000 metros de altitud.

El principal objetivo del viaje era conocer la extraordinaria avifauna del norte peruano, prestando especial atención a sus numerosas especies endémicas y de distribución restringida. La ruta permitió visitar algunos de los enclaves ornitológicos más importantes de esta parte de los Andes, entre ellos Chaparrí, Abra de Porculla, Pomacochas, Abra Patricia, Waqanki, la Cordillera Escalera, Plataforma/Flor de Café, Leymebamba y los valles secos del Marañón. La enorme variedad de hábitats encontrados a lo largo del recorrido se tradujo en cambios muy rápidos en las comunidades de aves y permitió combinar la búsqueda de especialidades muy localizadas con jornadas de elevada diversidad.

Entre las especies más destacadas del viaje se encontraron algunos de los endemismos más emblemáticos del Perú, como White-winged Guan, Piura Chat-Tyrant, Pale-billed Antpitta, Marvelous Spatuletail, Long-whiskered Owlet, Scarlet-banded Barbet, Cordillera Azul Antbird, Utcubamba Tapaculo, Chachapoyas Antpitta, Yellow-faced Parrotlet, Grey-bellied Comet y Great Spinetail, además de numerosas especies tumbesinas, amazónicas y andinas.

El viaje fue guiado por Álex Durand, con la asistencia de Marcel Gil Velasco, y contó con el apoyo fundamental de nuestros conductores, Horacio y Elvis, y de diversos guías y conocedores locales. Las páginas siguientes recogen el recorrido día a día, las principales localidades visitadas y las observaciones más destacadas de una ruta que permitió obtener una visión excepcionalmente completa de la diversidad ornitológica del norte del Perú.

Día 1: Bosque de Rafán y Humedales de Etén

Nuestro viaje comenzó en el Bosque de Rafán, una zona costera con una abundante vegetación dunar. Los primeros instantes de pajareo sirvieron para sumar especies comunes que nos acompañarían durante unos días, como Long-tailed Mockingbird, Amazilia Hummingbird o las abundantes Croaking Ground Dove y West Peruvian Dove. Sin embargo, enseguida empezamos a observar especies notables, entre las que destaca el Peruvian Plantcutter, una peculiar cotinga endémica del bosque seco del norte del Perú. Siguiendo sus llamativos cantos, logramos observar a placer diversos ejemplares, mientras iban apareciendo nuevas especies como Tumbesian y Grey-and-white Tyrannulets, White-browed Gnatcatcher, Baird's Flycatcher y el también endémico Cinereous Finch. Las temperaturas suaves mantenían una actividad ornitológica elevada y así, a medida que nos adentrábamos en el hábitat, fueron apareciendo también Scarlet-backed Woodpecker, Pacific Parrotlet, Necklaced Spinetail, Collared Antshrike, Fasciated Wren, un Lesser Night-hawk que pudimos observar posado y el casi endémico Superciliated Wren. De regreso hacia la carretera, nos detuvimos para observar una pareja de Peruvian Sheartail que habían hecho de un arbusto su territorio, mientras entre los árboles aledaños se movían también Short-tailed y Purple-collared Woodstars. Mientras observábamos los sheartails, detectamos cierto flujo de hirundínidos hacia el norte y, entre ellos, pudimos

observar un par de especies casi endémicas: nuestra primera Tumbes Swallow y el muy raro Peruvian Martin.

Con la sensación de que el viaje había empezado fuerte, nos desplazamos hacia los humedales de Etén, pero antes hicimos una parada en una zona puramente desértica donde disfrutamos de otro endemismo, el Coastal Miner, entre otras especies comunes como el siempre simpático Burrowing Owl, American Kestrel, Black y Turkey Vultures y un Variable Hawk. Ya en los humedales, lo primero que saltaba a la vista eran las grandes aves acuáticas, entre las que vimos varias decenas de Common Gallinule, Black-necked Stilt, una pareja de Killdeers, Puna Ibis, Snowy Egret, Western Cattle-Egret y algunas gaviotas como la abundante Gray-hooded Gull y también Belcher's y Kelp Gulls. Sin embargo, nuestro objetivo en esta zona era uno de los passeriformes palustres más hermosos, el Many-colored Rush Tyrant, del que, al cabo de poco, logramos observar 2 ejemplares. Desde el mismo punto, también sumamos Wren-like Rushbird y Chestnut-throated Seedeater.

Con los deberes hechos, empezamos a dirigirnos hacia nuestro hotel, pero antes realizamos una breve parada para observar los numerosos Peruvian Thick-knees que descansaban agrupados en una misma zona.

Algunas de las primeras especies endémicas observadas en el viaje: en la página anterior, el peculiar Peruvian Plantcutter; abajo izquierda, Coastal Miner; abajo derecha, un bonito macho del casi-endémico Peruvian Sheartail.



Día 2: Chaparrí y Bosque de Pómac

El segundo día de viaje iba a transcurrir en las montañas del interior de Chiclayo, explorando el bosque tumbesino para tratar de observar sus numerosas especies endémicas. El primer lugar que visitamos fue el Área de Conservación Privada de Chaparrí, donde, después de un maravilloso desayuno, iniciamos un día de pajareo de mucha calidad. Las primeras paradas, por las zonas más bajas, aportaron muchas especies que ya habíamos observado el día anterior y algunas nuevas, como Peruvian Pygmy-Owl, Golden Grosbeak, Fulvous-faced Scrub-Tyrant, Mouse-gray y Vermillion Flycatchers, Peruvian Meadowlark, Collared Warbling Finch, Saffron Finch y Parrot-billed Seedeater. A pesar de que había varias candidatas, la primera especialidad del día fue el casi endémico Tumbes Chat-Tyrant, que logramos fotografiar muy bien, y, poco después, una pareja del muy escaso Rufous Flycatcher. Una vez vistas las aves de la llanura baja, seguimos ascendiendo por la pista hasta llegar al ecolodge, donde, incluso antes de adentrarnos en los senderos, logramos observar una de las endémicas más escasas del viaje, el White-winged Guan. Dentro de los senderos, rodeados de bosque seco más denso y de mayor porte, fuimos sumando especies nuevas sin

parar, entre las que destacaron White-headed Brush-finch, Tumbes Pewee, Elegant Crescentchest, Tumbes Sparrow, Streak-headed Woodcreeper, White-tailed Jay, Plumbeous-backed Thrush, Hooded Siskin, White-edged Oriole y un solitario King Vulture cicleando junto al impresionante acantilado, entre otras especies. A ello, sumamos nuevas observaciones de calidad de White-winged Guan, cuya población, cifrada actualmente en unos cientos de ejemplares, parece estar recuperándose a buen ritmo gracias a los esfuerzos de conservación.

Después de almorzar una rica tilapia, todavía en Chaparrí, nos dirigimos hacia el Santuario Bosque de Pómac, deteniéndonos brevemente en la carretera para observar el primer Pearl Kite del viaje, además de un par de Savanna Hawks. Ya en el Bosque, las altas temperaturas hacían que la actividad fuera escasa, pero aun así logramos observar a placer no menos de 10 Tumbes Swallows, varias de ellas juveniles, que descansaban en unos árboles y realizaban pequeños vuelos de un árbol a otro. Acabamos el día en este mismo punto, observando al peculiar Short-tailed Field Tyrant y varios bandos de Sulphur-throated Finch.



Excelente mañana de pajareo por el Área de Conservación Privada de Chaparrí, con numerosas especies endémicas observadas: arriba, Tumbes Chat-Tyrant (izquierda) y Rufous Flycatcher (derecha); abajo, el críticamente amenazado White-winged Guan.



Espectaculares vistas de los cortados del Área de Conservación Privada de Chaparrí (arriba) y dos de las especies objetivo del Santuario Bosque Pómac (abajo): un juvenil de Tumbes Swallow (izquierda) y el peculiar Short-tailed Field Tyrant (derecha).

Día 3: Abra de Porculla y Bosque de Yanahuanca


El tercer día iba a suponer el primer pajareo en altura del viaje, amaneciendo ya en la zona de Abra de Porculla. Mientras Elvis preparaba un buen desayuno campero, la primera caminata produjo excelentes observaciones del escaso White-winged Brushfinch, integrando una bandada mixta donde detectamos al casi endémico Chapman's Antshrike, varios Slate-throated Redstart, Gray-and-gold y Three-banded Warblers, nuestros primeros Silvery Tanagers, Rusty Flowerpiercer y el muy escaso Henna-hooded Foliage-gleaner. En este tramo, destacaron también las observaciones de un Grey-chinned Hermit de la subespecie endémica local, un breve White-throated Hawk, dos nuevas especies de spinetail (Azara's y Line-cheeked), los primeros Great Thrush y Chiguanco Thrush del viaje, Black-cowled Saltator, Band-tailed Pigeons que iban y venían, un par de White-tipped Swifts, que supusieron los primeros vencejos del viaje, y un buen número de Ash-breasted Sierra Finch, sorprendentemente abundantes en la zona. Los colibrís también estaban presentes y, además de las especies que habíamos observado en días anteriores, sumamos nuestros primeros Sparkling Violetears del viaje.


Después de desayunar, retomamos nuestra ascensión a pie por la pista en busca de más especies y, pese al incómodo viento racheado, obtuvimos una observación estupenda de un Ecuadorian Piculet y un par de Rufous-chested Tanagers, entre otras especies comunes. Sin embargo, uno de los grandes objetivos del día se nos resistía, el endémico y cada vez más escaso Piura Chat-Tyrant. El creciente viento y la escasa actividad derivada no hacía presagiar nada bueno, pero gracias al buen hacer de nuestro guía, Álex, finalmente obtuvimos una excelente observación de un ejemplar. En ese mismo lugar, aparecieron también Chapman's Antshrike y Tumbes Pewee, que se dejaron ver mejor que en observaciones anteriores. Para completar la lista del lugar, añadimos nuestros primeros Hepatic Tanagers del viaje y un esquivo Rufous-necked Foliage-gleaner, siempre con el característico sonido de la Chestnut-crowned Antpitta de fondo.

Llegó el momento de emprender nuestro camino hacia el interior, descendiendo súbitamente en altura hacia la ciudad de Jaén. Poco antes de la parada del almuerzo, nos detuvimos en unos arrozales situados al fondo de un valle y allí observamos la única Roseate Spoonbill del viaje, en un lugar bastante inesperado por hallarse en un ambiente montañoso

y alejado de la costa; sin duda un ejemplar en migración. Esa misma parada produjo los primeros Shiny Cowbird del viaje.

Ya lejos de las montañas, y con el calor que caracteriza esta zona del norte peruano, nos dirigimos al bosque de Yanahuanca con el objetivo de observar especies en sus densos matorrales. Antes de ponernos a ello, echamos un vistazo a los prados abiertos de la zona, donde añadimos Drab Seedeater y Groove-billed Ani, pero la atención se fue pronto a los arbustos, desde donde reclamaba un Northern Slaty Antshrike que poco después lograríamos ver. Avanzamos por el camino entre el matorral y así fueron apareciendo un buen número de especies nuevas: Marañon Gnatcatcher, Purple-throated Euphonia, Yellow-tailed Oriole y un par de Hook-billed Kites que nos sobrevolaron a poca distancia. Unos metros más adelante conectamos por fin con uno de nuestros objetivos del lugar, el carismático Marañon Crescentchest, que pudimos observar a placer. Desde el mismo punto, observamos también otro endemismo exclusivo de esta zona, el Marañon Antshrike, y añadimos a la lista una fugaz Blue Ground Dove y Streaked Saltator. Tras un fantástico día, nos fuimos al hotel a descansar.





Tres especies de distribución reducida. Arriba, el atractivo Chapman's Antshrike y Ecuadorian Piculet (ambas observadas en Abra de Porculla); abajo, el carismático Marañon Crescentchest, visto en las proximidades del bosque de Yanahuanca. En la página anterior, otro endemismo de altura, el Piura Chat-Tyrant.

Día 4: Bosque de Yanahuanca y Pomacochas

Empezamos el día en la misma zona donde habíamos acabado el día anterior, con la esperanza de detectar el único endemismo que nos había quedado pendiente, el Chinchipe Spinetail. En esta ocasión, al cabo de poco de empezar a andar por la pista entre el matorral, detectamos dos ejemplares que acabamos observando muy bien. Además, sumamos otras especies nuevas para el viaje, como Blue-black Grassquit y Rufous-fronted Thornbird, y escuchamos Tataupa Tinamou y Stripped Cuckoo.

Sin tiempo para más, emprendimos el viaje hacia Pomacochas, realizando algunas paradas para observar especies nuevas. En la primera, casi sin quererlo, detectamos un pequeño grupo de Ecuadorian Ground Dove, que a la postre acabarían siendo las únicas del viaje. La segunda parada ya fue en un hábitat más particular, compuesto por laderas secas con buena cobertura de matorral y plantas crasas, y, pese a las elevadas temperaturas, pronto obtuvimos excelentes observaciones de otro endemismo importante, el Little Inca Finch, y añadimos a la lista Black-chested Buzzard-Eagle y Spot-throated Hummingbird. Poco después, realizamos una nueva parada entre los arrozales cercanos a Bagua Grande, donde conseguimos observar un Spotted Rail y escuchar otros 2. Finalmente, la última parada fue ya rodeados de nuevo de

montañas, esta vez para observar varias Fasciated Tiger Herons que se alimentaban en el río Utcubamba, donde también detectamos un Black Phoebe.

Llegamos por fin a Pomacochas. Después de un buen almuerzo, nos dirigimos hacia los comederos de Santos Montenegro, donde Álex sabía que se hallaba el único macho de Marvelous Spatuletail que lucía su espectacular cola en esta época. Nos apostamos cómodamente junto a los comederos y esperamos al colibrí admirable mientras nos deleitábamos con los numerosos Chestnut-breasted Coronet, Sparkling y Lesser Violetears, Purple-throated Sunangel, Bronzy Inca, Violet-fronted Brilliant, White-bellied Hummingbird y Little Woodstar. Finalmente hizo aparición el tan esperado Spatuletail, aunque demasiado brevemente para tomar fotografías. En ese momento, la lluvia interrumpió la actividad y a lo largo de la tarde solo pudimos añadir un pequeño grupo de Speckled Chachalaca como especie nueva para el viaje.

Por la noche, aprovechando que la lluvia por fin había despejado, nos dirigimos a una de las zonas conocidas para observar el Long-whiskered Owllet, pero pese a la intensa búsqueda por parte de Álex y del guía local, tan solo pudimos escuchar un ejemplar.

Día 5: Cresta de San Lorenzo y Pomacochas

El día amaneció de nuevo lluvioso, lo que complicó la ascensión, ya de por sí dura, de la trocha de la Cresta de San Lorenzo. Sin embargo, las especies que nos esperaban en la cima nos empujaban a seguir caminando. En la base del sendero observamos un precioso grupo de White-capped Tanagers y una pequeña pero diversa bandada mixta con un buen número de especies nuevas para el viaje: Cinnamon Flycatcher, White-tailed, White-banded y Black-capped Tyrannulets, Black-crested Warbler, Superciliaried Hemispingus y White-sided Flowerpiercer. Un poco más arriba observamos un Rufous Spinetail, la única Red-crested Cotinga del día y escuchamos los primeros Utcubamba Tapaculo, pero la lluvia impidió que nuestra lista durante la ascensión fuera más larga.

Ya en la cima, emprendimos nuestra búsqueda de las especies objetivo y, al cabo de poco, logramos observar a corta distancia dos ejemplares de la mítica y endémica Pale-billed Antpitta, para muchos la Antpitta más bonita del mundo. En el mismo lugar, obtu-

vimos excelentes observaciones de otro endemismo, el Johnson's Tody-Flycatcher y escuchamos a muy corta distancia una Chachapoyas Antpitta que, sin embargo, no quiso dejarse ver. Ya en pleno descenso, y con el sol brillando por fin en el cielo, dimos con una nueva bandada mixta, que en esta ocasión contenía otro endemismo, el Russet-mantlet Softail, además de Pearled Treerunner, Rufous-breasted Chat-Tyrant, Spectacled Redstart, Lacrimose Mountain Tanager, Blue-backed Conebill, Drab Hemispingud y Masked Flowerpiercer, entre otras especies. De nuevo en la base de la ascensión, y mientras esperábamos para comer una deliciosa trucha frita, buscamos nuevas especies interesantes entre prados y parches de bosque de ribera, obteniendo excelentes observaciones de Rufous-capped Antshrike, especie con una distribución muy restringida, y del exquisito Maroon-belted Chat-Tyrant. Además, añadimos los primeros Southern Emerald-Toucanets del viaje y un solitario Andean Guan.

Empujados por una gran mañana de pajareo, y por la trucha frita, decidimos probar suerte de nuevo con el Marvelous Spatuletail, con la esperanza de obtener mejores observaciones que la tarde anterior. Quizás gracias a la meteorología, más favorable, el protagonista no tardó en llegar y, en esta ocasión, sí se acercó varias veces a los comederos e incluso se perchó durante periodos bastante largos en distintas ramas,

para disfrute de todos los presentes. Además del colibrí, a lo largo de la tarde añadimos también a nuestra lista Highland Elaenia y un White-crowned Tapaculo escuchado.

Después de un día memorable, regresamos a nuestro hotel para descansar y prepararnos para otra jornada mágica que nos esperaba al día siguiente.



Pese a las duras condiciones meteorológicas, conseguimos ver buena parte de las especies míticas de la cresta de San Lorenzo. Arriba izquierda, un White-capped Tanager que integraba un grupo territorial; arriba derecha, el endémico Johnson's Tody-Flycatcher; abajo, el grupo pajareando ya de bajada por la bonita trocha.



Día 6: Abra Patricia

A medida que nos aproximábamos a las montañas de Abra Patricia, podíamos ver cómo el bosque nuboso mejoraba. Las colinas deforestadas desaparecieron y en su lugar teníamos ahora unas extensiones impresionantes de bosques vírgenes hasta donde alcanzaba la vista. Se trata, sin lugar a duda, de un lugar legendario en la escena ornitológica mundial y su magia se percibe ya solo con transitar sus senderos y carreteras. La primera parada, todavía en el fondo del valle, produjo los primeros Torrent Duck del viaje, además de Torrent Tyrannulet, White-collared Jay y Andean Solitaire, cuyo canto nos acompañaría durante los siguientes días en las montañas. Sin embargo, fue en la segunda parada, con una mayor elevación, cuando pudimos observar algunas de las especialidades de la zona, empezando por el muy localizado Royal Sunangel, primero una hembra alimentándose en flores de una ladera y después un macho, que pudimos disfrutar perchado durante largo rato. Durante la espera del Sunangel, fueron apareciendo otras aves, como un precioso macho de Golden-headed Quetzal, cuatro Cliff Flycatchers, Rufous-tailed Tyrant, Lesser Goldfinch, Amethyst-throated Sunangel y los primeros Long-tailed Sylph y Collared Inca del viaje, además de una buena colección de tangaras, a saber, Beryl-spangled, Saffron-crowned, Flame-faced y Green-and-gold Tanagers. Dos Pale-edged Flycatcher y un Bar-winged Wood-Wren completaron la lista de nuestras primeras horas en la zona.

Seguimos descendiendo por la carretera entre grandes árboles de bosque nuboso y, tras una breve parada junto al río para observar una simpática pareja de White-capped Dipper, nos topamos de nuevo con una variada bandada mixta, donde aparecieron especies tan notables como Vermillion Tanager, Slaty y Yellow-breasted Antwrens, Marble-faced Bristle-Tyrant, Olive-striped, Streak-necked y Slaty-capped Flycatchers, Streaked Xenops, Orange-bellied y Bronze-green Euphonias y White-winged Tanager, además del siempre llamativo Blue Dacnis. Momento de almorzar.

Después de disfrutar de la rica comida de la montaña peruana, nos dirigimos al que iba a ser nuestro alojamiento esa noche, el Owlet Lodge, y, tras instalarnos, decidimos descansar un rato observando la gran variedad de colibríes que acuden a los comederos, con algunas especies nuevas: Green-fronted Lancebill, Emerald-bellied Puffleg, Peruvian Racket-tail y Fawn-breasted Brilliant. En las inmediaciones del lodge, pudimos observar también Green-and-black Fruiteater y Grass-



Royal Sunangel, uno de los colibríes más buscados del viaje, en Abra Patricia.

green Tanager; caía la tarde, la temperatura iba bajando y parecía buena idea adentrarse en la red de senderos del alojamiento. Así, nos dirigimos a la torre de observación, donde vimos Mottle-cheeked Tyrannulet, y luego transitamos un bonito sendero donde una bandada mixta añadió a nuestras listas Rufous-crested Tanager, Russet-crowned Warbler, Olivaceous Siskin, Blue-naped Chlorophonia y Barred Becard. Un poco más adelante, entre la densa vegetación del sotobosque, logramos escuchar Streak-headed Antbird y Rufous-vented Tapaculo. Pero caía la noche, y era momento de cenar... y probar suerte de nuevo con el Long-whiskered Owlet.

Así, partimos de nuevo cuando ya era totalmente

oscuro, y pronto nos encontramos con nuestro guía local para los Owlets. Al cabo de nada ya estábamos escuchando un ejemplar y, después de cierta búsqueda, obtuvimos por fin una fantástica observación de este búho diminuto. ¡Ahora sí, allí estaba el mítico Long-whiskered Owlet! Pese a que era tarde, movidos por el entusiasmo, decidimos ir en busca de algunas especies de búhos más. Pronto dimos con un bonito Striped Owl y, un rato después, de nuevo en los senderos del lodge, con un todavía más bonito Cinnamon Screech-Owl, que observamos a placer.

Felices pero cansados, era momento de dar por concluido el que sin duda había sido uno de los mejores días del viaje.

Día 7: Abra Patricia y Waqanki

La mañana amaneció muy lluviosa, lo que nos hizo cancelar la visita a unos comederos donde acudía una Ochre-fronted Antpitta. En su lugar, descendimos por la carretera hasta la zona donde el día anterior habíamos detectado buena actividad, con la esperanza de que la meteorología fuera más favorable en cotas más bajas. La decisión acabó siendo acertada

y acabamos disfrutando de lo lindo con una buena colección de especies nuevas, entre las que destacaron Scaled Fruiteater, Masked Trogon y, todavía un poco más abajo, en una zona un poco más abierta, una nutrida bandada mixta con, de nuevo, Vermillion Tanager y otras tangeras: Yellow-throated, la endémica Black-bellied, Orange-eared, Bay-headed, Palm, Blue-

El grupo celebrando la observación del Long-whiskered Owlet.



Espectacular trio de búhos observados en Abra Patricia la noche del sexto día de viaje: el mítico Long-whiskered Owlet (arriba), Cinnamon Screech-Owl (abajo izquierda) y Stripped Owl (abajo derecha).



necked, Paradise y Golden Tanagers, además de Black-faced Dacnis, Buff-throated Saltator, Ashy-throated Chlorospingus, Gray-mantled Wren, Streaked Xenops, Versicolored Barbet y Rufescent Antshrike. Desde el mismo lugar, pudimos observar muy bien otra de las especies objetivo de la zona, el endémico Speckle-chested Piculet, además de Rufous-headed Pygmy-Tyrant. Descendiendo todavía un poco más por la carretera, añadimos el llamativo Ornate Flycatcher a nuestra lista y nos detuvimos obligatoriamente ante la presencia, a muy poca distancia, de 2 espectaculares Andean Cock-of-the-rock. Después de un almuerzo campero, sin tiempo para más, procedimos con nuestro recorrido.

El camino hasta nuestro alojamiento de esa noche, Waqanki Lodge, era largo, por lo que realizamos una parada intermedia en una pequeña zona húmeda en las inmediaciones de Nueva Cajamarca. El principal objetivo era observar el Pale-eyed Blackbird, y, gracias al conocimiento de la zona de Álex, pronto pudimos observar un ejemplar de esta especie casi endémi-

ca. Además, añadimos también nuestros primeros Black-capped Donacobius, Orange-backed Troupial, Dusky-headed Parakeet, de nuevo hasta tres fugaces Blue Ground Dove, Lineated Woodpecker, Crested Caracara, Short-tailed Swift y algunas aves acuáticas como el carismático Limpkin, Wattled Jacana, Purple Gallinule y una inesperada Rufous-sided Crake entre los nenúfares.

Una vez estiradas las piernas, y con buenas especies añadidas a nuestra lista, seguimos hacia Waqanki, donde llegamos todavía con luz para disfrutar de uno de los colibríes más bonitos del viaje, el Rufous-crested Coquette, que pudimos observar a placer. Por las verbenas del lodge se movían también otros colibríes propios de este estrato, como Violet-headed Hummingbird, Golden-tailed Sapphire y Sapphire-spangled Emerald, además de, de nuevo, varias Black-bellied Tanager y una pareja de Yellow-tufted Woodpeckers que tenía el nido en el jardín del alojamiento. Ya de noche, cenamos y nos fuimos a descansar.

Espectacular macho de Andean Cock-of-the-rock observado a placer en el Bosque de Protección Alto Nieva.





Día 8: Quebrada Mishquiyaq- uillo y Quebrada Upaquihua

Desayunamos temprano, pues nos esperaba una buena caminata por el productivo sendero que parte del lodge y asciende por la montaña siguiendo la quebrada. Ya en la primera parada, al poco de empezar a andar, pudimos observar Peruvian Warbling-Antbird y escuchar Black-and-white Tody-Flycatcher, Golden-collared Toucanet y Spot-winged Antbird. Poco después, nos detuvimos de nuevo para ver una pareja del diminuto Short-tailed Pygmy-Tyrant y, un poco más arriba, observamos también a otro miembro de la misma familia, el White-bellied Pygmy-Tyrant. La lluvia de la noche anterior había dejado un ambiente fresco y la actividad ornitológica en la selva era excelente. Seguimos avanzando por el sendero, atentos a los distintos sonidos que se escuchaban, hasta que Álex nos avisó de la presencia de un Painted Manakin, un bonito endemismo que constituía el principal objetivo que teníamos en aquel lugar; al cabo de

Dos especies muy buscadas: el endémico Speckle-chested Piculet, observado en Alto Nieva, y un precioso macho de Rufous-crested Coquette en Waqanki Lodge.



poco, pudimos observar un macho a poca distancia, perchedo en las ramas bajas de un parche de primario. Contentos con nuestra suerte, empezamos a descender de nuevo por el sendero, deteniéndonos enseguida para observar un Rufous Motmot a corta distancia. Un poco más abajo, dimos con una variada bandada mixta con hasta 4 especies de Woodcreeper (Straight-billed, Ocellated, Olivaceous y Plain-brown), además de Lemon-chested Greenlet y un buen número de tangeras nuevas para el viaje (Yellow-lore, Yellow-crested y Yellow-backed) y, ya para acabar nuestra estancia en Waqanki, visitamos los comederos del lodge, donde disfrutamos de hasta 12 especies de colibríes, entre los que destacaron, de nuevo, Rufous-crested Coquette (una hembra en este caso), Great-billed y Black-throated Hermit, Black-throated Mango, Violet-fronted Brilliant y Grey-breasted Sabrewing. Por las inmediaciones de los comederos también se movía una pequeña bandada mixta, que nos brindó buenas observaciones de Lefresnaye's Piculet y Little Woodpecker.

Partimos entonces hacia nuestro siguiente punto de pajareo, la Quebrada Upaquiuhua, pero a medio camino hicimos una parada en el Cañón Quiscarrumi para ver la impresionante concentración de Oilbirds que

duermen en esta zona, con varias decenas de ejemplares de todas las edades observados a placer.

Después de un almuerzo campero, llegamos por fin a la Quebrada Upaquiuhua una zona de matorral seco que comparte algunas especies más propias de los bordes del Amazonas brasileño, pero que sin embargo tienen una distribución muy restringida en el Perú. Dos de estas especies son el Rusty-backed Antwren, del que finalmente logramos ver una pareja a placer, y el Ashy-headed Greenlet, que también pudimos observar con facilidad. Además de estas dos especialidades, también vimos otras especies notables, como Barred Antshrike y Pearly-vented Tody-Tyrant. Las primeras White-banded Swallow y White-lined Tanager del viaje completaron la lista de especies nuevas avistadas en este lugar.

De camino al hotel, nos detuvimos en una pequeña zona húmeda, donde observamos nuestros primeros Brazilian Teal, un pato que se halla en proceso de colonizar el Perú; un poco más adelante, topamos con un llamativo Three-toed Sloth que descansaba en lo alto de un árbol. Sin tiempo para más, satisfechos después de un día de pajareo muy completo, nos dirigimos a nuestro hotel para cenar y descansar.

Con una distribución más extensa en los bordes secos del Amazonas brasileño, el Ashy-headed Greenlet y el Rusty-backed Antwren tienen en el Perú poblaciones mucho más localizadas. Vistas ambas en la Quebrada Upaquiuhua.



Día 9: Llegada a Flor de Café/Plataforma

Nos esperaba un día de travesía hasta la remota comunidad de Flor de Café/Plataforma, situada al pie de la Cordillera Azul, a través de la pista que sube desde Bellavista. Para ello, dejamos nuestro minibús con nuestro conductor, Elvis, y nos subimos a un 4x4 capaz de transitar estos caminos. A pesar de la mejora de las condiciones de la pista, sigue habiendo tramos bacheados y embarrados, por lo que el ascenso es lento y requiere tanto de un vehículo de esas características como de unas cuantas horas de conducción lenta. Por ello, fuimos realizando diferentes paradas a lo largo del camino, que nos permitieron estirar las piernas y sumar unas cuantas especies destacables.

La primera parada fue aún en la llanura arrocerá cercana a la ciudad de Bellavista. Allí, en un meandro del Río Biavo, pudimos ver algunas especies típicas del ecosistema fluvial amazónico, como Large-billed Tern, Pied Plover, Amazon y Green Kingfishers y el mítico y peculiar Hoatzín, entre otras. Además, una fugaz Grey-breasted Crake cruzó la carretera.

Poco después, nos hallábamos ya en plena ascensión, transitando entre parches aislados de bosque y grandes extensiones de campos de cultivo, primero maíz y finalmente café. En las diversas paradas que realizamos, pudimos ver White-necked y Western Striolated Puffbirds, el escaso Yellow-billed Nunbird, Bluish-fronted Jacamar, Chestnut-eared Aracari, un Bat Falcon posado frente a una iglesia en plena misa de domingo, el endémico Mishana Tyrannulet y Forest Elaenia. Las rapaces resultaron más abundantes que en otras zonas visitadas durante el tour, añadiendo Plumbeous Kite, White Hawk e incluso una pareja de Black Hawk-Eagle a nuestras listas, siempre bajo el vuelo de los omnipresentes, pero no por ello menos espectaculares, Swallow-tailed Kites.

Capítulo aparte merece el grupo de White-browed Titi Monkey que observamos fantásticamente y que a la postre sería uno de los mamíferos más interesantes del viaje.

Con cantos notorios pero costumbres discretas, tanto el enigmático Foothill Shiffornis (izquierda) como la también muy buscada Grey-tailed Plha (derecha) se dejaron ver de lujo en Flor de Café/Plataforma.



Llegamos por fin a Flor de Café y nos dirigimos rápidamente al mítico hospedaje El Capito, que lleva el nombre local de uno de nuestros principales objetivos en la zona, el Scarlet-banded Barbet. Después de un buen almuerzo, y percibir que nos hallábamos en una de las mecas de la ornitología mundial, fuimos en su busca. Al poco, estábamos disfrutando con la observación de una pareja de este endemismo extremo, perchada a corta distancia y con el canto de un Foothill Schiffornis de fondo, que después veríamos a placer perchado en el sotobosque. En la misma zona del Barbet añadimos también otras especies interesantes, como una pareja de White-fronted Nunbird, Yellow-breasted Antwren, Versicolored y Gilded Barbet, Masked Tityra, Buff-throated tody-Tyrant y Lesser Elaenia.

Empezamos entonces la ruta de regreso al pueblo, avanzando lentamente por una pista que transitaba por zonas bastante abiertas. A partir de cierta hora de la tarde, la actividad aumento ostensiblemente y, cada poco, nos veíamos obligados a detenernos para no perdernos nada. Mientras observábamos un Lined Antshrike entre el denso midstory, hizo aparición una nutrida bandada mixta que incluía especies tanto de zonas bajas como de piedemonte, entre las que destacaron Golden-rumped Euphonia, Blue-naped Chlorophonia y 2 Strong-billed Woodcreepers de la forma local, todavía por describir.

Si bien podríamos haber dado el día por concluido después de una tarde de pajareo tan memorable, todavía había tiempo para más, pues después de cenar teníamos planeada una salida para ver algunas especies nocturnas. A pesar de que la actividad vocal parecía escasa inicialmente, posiblemente debido a la fuerte iluminación de la luna, a medida que avanzaba la noche los búhos fueron despertando y finalmente logramos escuchar Foothill Screech-Owl y observar Band-bellied Owl y, ahora sí, acabar el día con un precioso Long-tailed Potoo posado para el deleite de todos.

Pese a la intensa deforestación que sufre toda la región, la Cordillera Azul y su zona de influencia todavía mantienen poblaciones de algunos mamíferos interesantes, como este White-browed Titi Monkey observado de camino a Flor de Café/Plataforma



Día 10: Flor de Café/Plataforma

Íbamos a pasar toda la mañana en Plataforma y no podíamos esperar a recorrer la zona, así que salimos ya con las primeras luces. El primer objetivo no era otro sino el Cordillera Azul Antbird, una especie descubierta tan solo en 2021. Con la ayuda de Eugenio, dueño del hospedaje y perfecto conocedor de la avifauna local, nos dirigimos a uno de los pocos territorios de esta especie conocidos y pronto logramos primero escuchar y después ver un ejemplar a corta distancia, que se acercó andando por el suelo del bosque antes de realizar un pequeño vuelo y esconderse para siempre, haciendo gala de la timidez que caracteriza a este hormiguero. Casi desde el mismo punto vimos también otra de las especialidades de la zona, el Yellow-throated Spadebill, además de escuchar al muy esquivo Short-tailed Antthrush. De regreso al punto donde habíamos dejado el coche, conectamos con otras especies interesantes como White-throated Spadebill, una Grey-tailed Piha observada a placer a nuestra misma altura, 2 Blackish Nightjars durmiendo en una plantación de café, Yungas y Blue-rumped Manakins, Scaled y Scarlet-breasted

Fruiteater escuchados, Olive-chested Flycatcher y una impresionante bandada mixta con, entre otras especies, Green-throated Tanager, White-winged Shrike-Tanager, Dusky-capped Greenlet, Common Chlorospingus, un Yungas Long-tailed Woodcreeper (de nuevo, una forma de esta especie todavía por describir) del que pudimos tomar buenas fotografías, Rufous-rumped y Rufous-tailed Foliage-gleaners, Ash-browed Spinetail, Green-backed Becard, y el escaso Sooty-headed Tyrannulet. A esta impresionante lista se suman un Double-toothed Kite visto a primera hora y un colibrí, el Napo Sabrewing, del que encontramos un lek en medio del bosque.



Descubierta tan solo a principios del siglo XXI, el Scarlet-banded Barbet se ha convertido en una de las especies más buscadas en Plataforma/Flor de Café. En nuestro tour, tuvimos la suerte de dar con esta pareja durante la primera tarde de pajareo por la zona.



Maravilloso trio de aves nocturnas observadas en Flor de Café/Plataforma: izquierda, Long-tailed Potoo; derecha arriba, Band-bellied Owl; abajo, Blackish Nightjar descansando en una plantación de café.

Con todos los objetivos cumplidos, regresamos al hospedaje para almorzar y emprender nuestro largo camino de nuevo a Bellavista, con una parada intermedia donde añadimos Crowned Slaty Flycatcher y Chestnut-tailed Antbird a nuestras listas. Una vez

en Bellavista, nos reencontramos con Elvis, nos subimos de nuevo al minibús y nos dirigimos a Tarapoto, donde teníamos reservado nuestro hotel para aquella noche.

Día 11: Cordillera Escalera y Nueva Cajamarca

Después de un breve desplazamiento en coche, amanecemos ya en la Cordillera Escalera, que exploramos a lo largo de toda la mañana. La primera parada fue en el bonito mirador Alto Ahuashiyacu, donde nos apostamos alrededor de las verbenas y los comederos de colibríes. Al poco apareció nuestra especie objetivo, el espectacular Black-bellied Thorntail, además de Amethyst Woodstar y otras especies comunes en este estrato. Desde este punto, también pudimos ver numerosas especies de euphonias que acudían a comer frutos de un arbusto cercano, a saber: Purple-throated, Golden-bellied, Thick-billed, Orange-bellied y Rufous-bel-

lied Euphonia. En el mismo arbusto, también aparecieron White-lored y Yellow-crowned Tyrannulets y, a lo lejos, pudimos observar nuestra primera Swallow Tanager del día y del viaje.

La siguiente parada incluía el desayuno, que nos prepararon para nosotros en el Mono y la Gata, cuyos comederos exteriores ofrecen también buenas oportunidades de observación. Así vimos a placer dos machos de Golden-headed Manakin, dos ejemplares de Long-billed Gnatwren, un bonito Amazonian Viola-ceous Trogon y Olive-faced Flatbill, entre otras.



Arriba a la izquierda, una de las dos Solitary Eagles que nos sorprendieron en Cordillera Escalera, seguidas de una Black Hawk-Eagle inmadura (arriba derecha). Abajo, el atractivo Black-bellied Thorntail.

A partir de este momento, nos desplazamos en dirección al túnel Yurimangas, realizando paradas en distintas zonas de la carretera donde se hallaban las flores adecuadas, hasta que dimos con el Koepcke's Hermit, un ermitaño endémico y muy localizado. Por el camino, nos sorprendieron dos Solitary Eagles, un adulto y un inmaduro, inmediatamente seguidas de un inmaduro de Black Hawk-Eagle, y otras especies nuevas para el viaje, como Dusky-chested Flycatcher y Chestnut-bellied Seed-Finch. Los numerosos Swallow-tailed Kites que planeaban entre las nubes hacían que el paisaje fuera todavía más espectacular.

Ya de regreso a nuestro alojamiento, cerca de Rioja, nos detuvimos en un punto conocido por Álex donde pronto pudimos ver a placer un par del peculiar Point-tailed Palm-creeper, además de Spot-breasted Woodpecker, Ringed Kingfisher y Riparian Parrotlet, entre otras especies.

Tras otro día de pajareo intenso, llegamos por fin al hotel, cenamos y nos fuimos a descansar.

Día 12: Reserva Arena Blanca y llegada a Leymebamba

Nuestro día empezó en la Reserva Arena Blanca, donde debíamos llegar muy pronto para no perdernos la entrada de diversas especies a los famosos comederos que mantienen en esta reserva. Tanto es así, que cuando por fin llegamos al hide vimos que las Chestnut-breasted Wood-Quails, tres ejemplares, estaban ya alimentándose en la bonita zona acondicionada para ello. Poco después hicieron aparición los Cinereous Tinamous, dos adultos y un pollo ya muy crecido que se mostraron muy territoriales defendiendo los puntos de alimentación. Ello hizo que inicialmente el Little Tinamou apareciera solo fugazmente en los márgenes del claro, siendo expulsado inmediatamente por alguno de los Cinereous. Finalmente, cuando estos últimos se fueron, aparecieron 3 bonitos Little Tinamous, de nuevo una pareja con un pollo, en esta ocasión más joven. Entre medias, un Orange-billed Sparrow, el único del viaje, hacía apariciones intermitentes y fugaces en el suelo de los márgenes del claro.

Contentos con las observaciones y las fotos obtenidas, de unas especies muy difíciles de ver tan bien en el bosque, nos dirigimos entonces a las verbenas y comederos de colibríes de la finca, donde observamos hasta 17 especies diferentes. Entre ellas, destacaron el Wire-crested Thorntail, tan espectacular como el Black-bellied del día anterior, Blue-fronted Lancebill, Brown Violetear, Blue-tailed Emerald, Rufous-breasted y Green Hermits y el diminuto Little Woodstar, una de las aves más pequeñas del mundo. En las inmediaciones de los comederos, los numerosos arbustos con frutos atraían también un buen número de especies frugívoras, entre las que destacó sobre todo un bonito macho de Fiery-capped Manakin que pudimos observar a placer.

Pero el lugar todavía nos tenía reservada una grata sorpresa. La espera junto a las abundantes heliconias colgantes tuvo finalmente premio con la llegada de uno de los colibríes más peculiares y a la vez difíciles

El peculiar Buff-tailed Sickiebill, uno de los colibríes más raros del mundo, que pudimos observar a placer perchado y alimentándose en las heliconias de la Reserva Arena Blanca





Tres especies de lo más discretas observadas a placer en el hide de la Reserva Arena Blanca. Little Tinamou (arriba), Chestnut-breasted Wood-Quail (abajo izquierda) y Cinereous Tinamou (abajo derecha).



de ver en todo el mundo, el Buff-tailed Sicklebill. Primero acudió a alimentarse de las flores, de las que se colgaba para así introducir su curioso pico, y posteriormente se perchó entre el denso ramaje circundante, donde permanecía largo rato antes de volver a las flores. ¡Sin duda una de las mejores observaciones de todo el tour!

Después de unas cuantas horas de lo más provechosas, abandonamos la Reserva y el bosque húmedo y nos adentramos en los valles secos de la cuenca del río Utcubamba, ascendiendo por una estrecha carretera que nos llevaría hasta Leymebamba. Tanto el hábitat como las especies cambiaron rápidamente y, en la primera parada, pudimos ver ya dos buenas


especialidades del lugar: el endémico Black-necked Woodpecker y la casi endémica Buff-bellied Tanager. Además, añadimos otra especie común, pero con una distribución restringida, como es el Marañón Thrush.

Ya en Leymebamba, nos dirigimos a la zona del museo, donde esperamos a que se acabara de hacer de noche para iniciar la búsqueda del último búho del viaje, el casi endémico Koepcke's Screech-Owl. Escuchamos al primer ejemplar todavía con las últimas luces, pero no fue hasta caída la noche que no logramos observar a placer un ejemplar posado. Con esta imagen en la retina, nos fuimos a cenar a la bonita ciudad de Leymebamba, dando el día por concluido.

Día 13: Leymebamba y Abra Barro Negro

Teníamos ante nosotros uno de los días más excitantes del tour. El plan consistía en empezar a pajarear de nuevo en la zona del museo, a unos 2200 msnm, ir ascendiendo por la carretera hasta el paso de Calla Calla, a 3600 msnm, luego descender por los secos valles del Marañón hasta los tan solo 840 msnm de la localidad de Balsas, ascender de nuevo a más de 3000 msnm y llegar a dormir a Celendín, situado a 2600 msnm. Con tanta variación en la altitud, era de esperar una buena diversidad de aves, y así fue.

Empezamos la mañana cerca de Leymebamba, en la vertiente húmeda de la cordillera, donde nos reencontramos con colibríes de altura, entre los que destacaron Green-tailed Trainbearer, Tyrian Metaltail y un Sword-billed Hummingbird muy bien observado alimentándose de flores. Además, añadimos también a nuestras listas al atractivo Rufous-winged Tyrannulet. La actividad, sin embargo, no era demasiado buena, por lo que nos desplazamos un poco más arriba de la carretera. Ayudados también por la mejo-



Dos de las especies endémicas más tímidas: la Chachapoyas Antpitta (izquierda) y el Utcubamba Tapaculo (derecha), ambas muy bien observadas en Calla Calla.

ra de la meteorología, en esta zona sí disfrutamos de lo lindo con una buena abundancia y diversidad de aves. Mientras buscábamos al espectacular Rainbow Starfrontlet, del que acabamos viendo no menos de 3 ejemplares, dimos con una bandada mixta que incluía Barred Becard, Cinnamon Flycatcher, White-banded y Tawny-rumped Tyrannulets, Yellow-breasted Brushfinch, Blue-capped Tanager, White-sided y Masked Flowerpiercers, Drab Hemispingus y un par de reinitas, Spectacled Redstart y Black-crested Warbler. En la misma zona, logramos ver también un bonito Crowned Chat-Tyrant e incluso un Yungas Pygmy-Owl, acosado incesantemente por muchas de las aves presentes.

Nos hallábamos ya cerca de los 3000 msnm, dentro ya del estrato que ocupa el endémico Utcubamba Tapaculo. Después de un primer intento fallido con el primer ejemplar que escuchamos, nos desplazamos todavía un poco más arriba y, en esta ocasión, sí logramos ver a placer un ejemplar de esta especie tan esquiva. Desde el mismo punto, escuchamos una lejana Leymebamba Antpitta, que sin embargo no quiso mostrarse. Poco después, gracias a los conocimientos de Álex, sí obtuvimos una excelente observación de otro endemismo carismático, la Chachapoyas Antpitta, de la que además pudimos obtener buenas fotografías. Ya cerca del paso de Calla Calla, de nuevo entre la niebla, escuchamos Neblina Tapaculo y observamos otras especies de altura nuevas para nosotros, como Scar-

let-bellied Mountain Tanager, Blue-and-black Tanager, Andean Flicker, Many-stripped Canastero, Moustached Flowerpiercer y Plain-coloured Seedeater. Un poco más adelante, justo tras superar el puerto, dimos con el fantástico Coppery Metaltail, además de mejorar nuestras observaciones previas de otro endemismo, el Russet-mantled Softail.

Seguimos descendiendo hacia Balsas, deleitándonos con la espectacularidad del paisaje, que pronto se transformó en grandes valles secos con vegetación arbustiva abierta y abundantes cactus tubulares. La siguiente parada la hicimos ya en este hábitat, e inmediatamente notamos el ascenso de la temperatura. Las especies habían cambiado por completo y ahora los esfuerzos se centraban en localizar algunas especies endémicas del Maraón. La primera de ellas fue el Grey-winged Inca Finch, del que obtuvimos buenas imágenes, pero pronto observamos también a placer al muy localizado Chestnut-backed Thornbird y al último Inca Finch del viaje: el Buff-bridled Inca Finch. En esta vertiente vimos además las primeras Bare-faced Ground Dove del viaje y nos reencontramos con algunas especies propias de estos hábitats que habíamos detectado ya durante los primeros días del viaje: Maraón Gnatcatcher, Peruvian Meadowlark, Yellow-tailed Oriole, Golden Grosbeak, etc.

Nos quedaba un único objetivo pendiente, uno bastante difícil, el Yellow-faced Parrotlet. Este periquito endémico y localizado está muy ligado a la dis-

El impresionante valle del Maraón, un hábitat que hospeda numerosas especies endémicas distribuidas en distintos estratos de altitud.



Tres endemismos de las zonas bajas del Marañón, observados en Balsas: el esquivo Yellow-faced Parrotlet (arriba), Grey-winged Inca Finch (abajo izquierda) y Chestnut-backed Thornbird (abajo derecha)



ponibilidad de alimento en una u otra zona de estos gigantescos valles, por lo que su presencia resulta impredecible. En esta ocasión, sin embargo, sí tuvimos suerte, detectando primero un ejemplar a muy corta distancia y después un gran grupo de más de 30 aves concentrándose para dormir en unos frutales.

Con todos los objetivos cumplidos, nos quedaba “solamente” ascender hasta Celendín a través de la tortuosa carretera que serpentea por la ladera del valle. Tras un gran trabajo de nuestro conductor, Elvis, llegamos por fin a nuestro hotel y nos fuimos a cenar y descansar.



Día de contrastes en lo ornitológico y también en lo paisajístico: de las zonas altas de neblina en el paso de Calla Calla, a los fondos de valle secos de la cuenca del Marañón.



A la izquierda, el carismático Grey-breasted Comet, uno de los colibríes más raros del mundo. A la derecha, el también endémico Black Metaltail.

Día 14: Cruz Conga y Puente Sangal

La mañana transcurrió entre Celendín y Cajamarca, explorando las zonas altas y su avifauna, entre la que destacan algunos endemismos. A pesar de que la lluvia dificultó las primeras horas de pajareo, en la zona de Cruz Conga dimos con una bandada mixta que incluía al endémico Plain-tailed Warbling Finch, además de Golden-billed Saltator, Cinereous Conebill y Yellow-breasted Brushfinch. También disfrutamos con el atractivo Tufted Tit-Tyrant y, tras una buena dosis de paciencia, todos pudimos ver a la Cajamarca Antpitta, una de las antpittas endémicas más tímidas, junto con dos ejemplares de Grey-browed Brushfinch que se alimentaban en el suelo del mismo margen arbustivo. De fondo se escuchaba una Stripe-headed

Antpitta y nos sobrevolaron las primeras Andean Gull del viaje.

De ahí nos desplazamos al cercano mirador Encañada y, ya con el sol luciendo en el cielo, añadimos a nuestras listas un inesperado White-tailed Shrike-Tyrant, además de Black-crested Tit-Tyrant, Black-throated Flowerpiercer y Band-tailed Seed eater.

Tras un buen almuerzo en Cajamarca, nos dirigimos al famoso Puente Sangal, el único punto conocido para observar al Grey-bellied Comet, un colibrí endémico muy ligado a hábitats arbustivos en laderas escarpadas. Pese a la lluvia inicial, y las obras que mantenían cortada la carretera, finalmente logramos observar muy bien dos ejemplares, además de otro colibrí endémico, el Black Metaltail. A lo largo de la bonita caminata, resiguiendo el río, fuimos detectando una buena colección de especies nuevas, lo cual era indicativo de lo muy peculiar que era el hábitat que estábamos explorando. En los cortados situados en lo alto de las laderas vimos Streak-throated Bush-Tyrant y Black-billed Shrike-Tyrant, además de una bonita colonia de Andean Swifts. La búsqueda del colibrí aportó, además, una inesperada observación de Rainbow Starfrontlet, nuevamente Black-throated Flowerpiercer y el primer Blue-and-yellow Tanager del viaje, para acabar el día deleitándonos con una pareja de White-winged Cincloides alimentándose en el río.



Observando una Cajamarca Antpitta en Cruz Conga, al paso de un local.

Día 15: Río Cajamarquino y retorno al aeropuerto de Cajamarca

Iniciamos nuestro último día de viaje en la zona del río Cajamarquino, un excelente lugar para hallar la última especie endémica que quedaba pendiente, el Great Spinetail. Tras una intensa búsqueda por las laderas secas con vegetación arbustiva abierta, dimos por fin con una pareja que se mostró inusualmente bien, permitiendo la obtención de excelentes fotografías. Además de esta, sumamos también Black-lored Yellowthroat y White-winged Black-Tyrant, convirtiéndose esta en la última especie nueva del viaje.

Sin tiempo para más, nos dirigimos hacia el aeropuerto de Cajamarca, donde dimos el tour por finalizado con un gran éxito.



El último endemismo visto durante el tour: una pareja de Great Spinetail que se mostraron inusualmente bien, permitiendo obtener buenas fotografías.

Y la última foto de grupo, cerca del río Cajamarquino momentos antes de partir hacia el aeropuerto.



Lista sistemática de las especies observadas

A continuación, se listan todas las especies vistas durante el tour, indicando el nombre en inglés, científico y si se trata de un endemismo (código EN).

1	Cinereous Tinamou	<i>Crypturellus cinereus</i>	
2	Tataupa Tinamou	<i>Crypturellus tataupa</i>	
3	Little Tinamou	<i>Crypturellus soui</i>	
4	Black-bellied Whistling-Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	
5	Comb Duck	<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	
6	Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	
7	Torrent Duck	<i>Merganetta armata</i>	
8	White-winged Guan	<i>Penelope albipennis</i>	EN
9	Andean Guan	<i>Penelope montagnii</i>	
10	Speckled Chachalaca	<i>Ortalis guttata</i>	
11	Rufous-breasted Wood-Quail	<i>Odontophorus speciosus</i>	
12	Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>	
13	Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>	
14	Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas fasciata</i>	
15	Peruvian Pigeon	<i>Patagioenas oenops</i>	EN
16	Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas plumbea</i>	
17	Ruddy Pigeon	<i>Patagioenas subvinacea</i>	
18	Ruddy Ground Dove	<i>Columbina talpacoti</i>	
19	Ecuadorian Ground Dove	<i>Columbina buckleyi</i>	
20	Croaking Ground Dove	<i>Columbina cruziana</i>	
21	Blue Ground Dove	<i>Claravis pretiosa</i>	
22	Bare-faced Ground Dove	<i>Metriopelia ceciliae</i>	
23	White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	
24	White-throated Quail-Dove	<i>Zentrygon frenata</i>	
25	West Peruvian Dove	<i>Zenaida meloda</i>	
26	Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	
27	Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	
28	Groove-billed Ani	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	
29	Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>	
30	Common Squirrel-Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>	
31	Lesser Nighthawk	<i>Chordeiles acutipennis</i>	
32	Blackish Nightjar	<i>Nyctipolus nigrescens</i>	
33	Common Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>	
34	Long-tailed Potoo	<i>Nyctibius aethereus</i>	
35	Oilbird	<i>Steatornis caripensis</i>	
36	Chestnut-collared Swift	<i>Streptoprocne rutila</i>	
37	White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	
38	Short-tailed Swift	<i>Chaetura brachyura</i>	
39	White-tipped Swift	<i>Aeronautes montivagus</i>	

40	Andean Swift	<i>Aeronautes andecolus</i>	
41	Fork-tailed Palm Swift	<i>Tachornis squamata</i>	
42	White-necked Jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	
43	Buff-tailed Sicklebill	<i>Eutoxeres condamini</i>	
44	Rufous-breasted Hermit	<i>Glaucis hirsutus</i>	
45	Green Hermit	<i>Phaethornis guy</i>	
46	Koepcke's Hermit	<i>Phaethornis koepckeae</i>	EN
47	Great-billed Hermit	<i>Phaethornis malaris</i>	
48	Black-throated Hermit	<i>Phaethornis atrimentalis</i>	
49	Grey-chinned Hermit	<i>Phaethornis griseogularis</i>	
50	Green-fronted Lancebill	<i>Doryfera ludovicae</i>	
51	Blue-fronted Lancebill	<i>Doryfera johannae</i>	
52	Sparkling Violetear	<i>Colibri coruscans</i>	
53	Brown Violetear	<i>Colibri delphinae</i>	
54	Lesser Violetear	<i>Colibri cyanotus</i>	
55	Black-throated Mango	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	
56	Amethyst-throated Sunangel	<i>Heliangelus amethysticollis</i>	
57	Purple-throated Sunangel	<i>Heliangelus viola</i>	
58	Royal Sunangel	<i>Heliangelus regalis</i>	
59	Wire-crested Thorntail	<i>Discosura popelairii</i>	
60	Black-bellied Thorntail	<i>Discosura langsdorffi</i>	
61	Rufous-crested Coquette	<i>Lophornis delattrei</i>	
62	Long-tailed Sylph	<i>Agelaiocercus kingii</i>	
63	Grey-bellied Comet	<i>Taphrolesbia griseiventris</i>	EN
64	Green-tailed Trainbearer	<i>Lesbia nuna</i>	
65	Tyrian Metaltail	<i>Metallura tyrianthina</i>	
66	Coppery Metaltail	<i>Metallura theresiae</i>	EN
67	Black Metaltail	<i>Metallura phoebe</i>	EN
68	Sapphire-vented Puffleg	<i>Eriocnemis luciani</i>	
69	Emerald-bellied Puffleg	<i>Eriocnemis aline</i>	
70	Marvelous Spatuletail	<i>Loddigesia mirabilis</i>	EN
71	Shining Sunbeam	<i>Aglaeactis cupripennis</i>	
72	Bronzy Inca	<i>Coeligena coeligena</i>	
73	Collared Inca	<i>Coeligena torquata</i>	
74	Violet-throated Starfrontlet	<i>Coeligena violifer</i>	
75	Rainbow Starfrontlet	<i>Coeligena iris</i>	
76	Sword-billed Hummingbird	<i>Ensifera ensifera</i>	
77	Great Sapphirewing	<i>Pterophanes cyanopterus</i>	
78	Chestnut-breasted Coronet	<i>Boissonneaua matthewsii</i>	
79	Peruvian Racket-tail	<i>Ocreatus peruanus</i>	
80	Fawn-breasted Brilliant	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	
81	Violet-fronted Brilliant	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	
82	Long-billed Starthroat	<i>Heliopteryx longirostris</i>	
83	Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystina</i>	
84	Peruvian Sheartail	<i>Thaumastura cora</i>	

85	Short-tailed Woodstar	<i>Myrmia micrura</i>
86	Purple-collared Woodstar	<i>Myrtis fanny</i>
87	Little Woodstar	<i>Chaetocercus bombus</i>
88	Blue-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>
89	Violet-headed Hummingbird	<i>Klais guimeti</i>
90	Grey-breasted Sabrewing	<i>Campylopterus largipennis</i>
91	Napo Sabrewing	<i>Campylopterus villaviscensio</i>
92	Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>
93	Spot-throated Hummingbird	<i>Thaumasius taczanowskii</i>
94	Many-spotted Hummingbird	<i>Taphrospilus hypostictus</i>
95	Amazilia Hummingbird	<i>Amazilis amazilia</i>
96	Golden-tailed Sapphire	<i>Chrysuronia oenone</i>
97	Sapphire-spangled Emerald	<i>Chionomesa lactea</i>
98	White-bellied Hummingbird	<i>Elliotomyia chionogaster</i>
99	Spotted Rail	<i>Pardirallus maculatus</i>
100	American Moorhen	<i>Gallinula galeata</i>
101	Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinica</i>
102	Rufous-sided Crake	<i>Laterallus melanophaius</i>
103	Grey-breasted Crake	<i>Laterallus exilis</i>
104	Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>
105	Peruvian Thick-knee	<i>Hesperoburhinus superciliaris</i>
106	Black-necked Stilt	<i>Himantopus mexicanus</i>
107	American Oystercatcher	<i>Haematopus palliatus</i>
108	Pied Plover	<i>Hoploxypterus cayanus</i>
109	Killdeer	<i>Charadrius vociferus</i>
110	Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>
111	Andean Gull	<i>Chroicocephalus serranus</i>
112	Grey-hooded Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>
113	Belcher's Gull	<i>Larus belcheri</i>
114	Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>
115	Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>
116	Hoatzin	<i>Opisthocomus hoazin</i>
117	Neotropic Cormorant	<i>Nannopterum brasilianum</i>
118	Puna Ibis	<i>Plegadis ridgwayi</i>
119	Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>
120	Fasciated Tiger-Heron	<i>Tigrisoma fasciatum</i>
121	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>
122	Little Blue Heron	<i>Egretta caerulea</i>
123	Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>
124	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>
125	Western Cattle-Egret	<i>Ardea ibis</i>
126	Great White Egret	<i>Ardea alba</i>
127	King Vulture	<i>Sarcoramphus papa</i>
128	American Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>
129	Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>

130	Pearl Kite	<i>Gampsonyx swainsonii</i>
131	Hook-billed Kite	<i>Chondrohierax uncinatus</i>
132	Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>
133	Black Hawk-Eagle	<i>Spizaetus tyrannus</i>
134	Sharp-shinned Hawk	<i>Accipiter striatus</i>
135	Double-toothed Kite	<i>Harpagus bidentatus</i>
136	Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>
137	Savanna Hawk	<i>Buteogallus meridionalis</i>
138	Solitary Eagle	<i>Buteogallus solitarius</i>
139	Roadside Hawk	<i>Rupornis magnirostris</i>
140	Variable Hawk	<i>Geranoaetus polyosoma</i>
141	Black-chested Buzzard-Eagle	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>
142	White Hawk	<i>Pseudastur albicollis</i>
143	White-throated Hawk	<i>Buteo albigula</i>
144	Koepcke's Screech-Owl	<i>Megascops koepckeae</i>
145	Cinnamon Screech-Owl	<i>Megascops petersoni</i>
146	Foothill Screech-Owl	<i>Megascops roraimae</i>
147	Band-bellied Owl	<i>Pulsatrix melanota</i>
148	Yungas Pygmy-Owl	<i>Glaucidium bolivianum</i>
149	Peruvian Pygmy-Owl	<i>Glaucidium peruanum</i>
150	Long-whiskered Owlet	<i>Xenoglaux loweryi</i>
151	Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>
152	Striped Owl	<i>Asio clamator</i>
153	Golden-headed Quetzal	<i>Pharomachrus auriceps</i>
154	Amazonian Violaceous Trogon	<i>Trogon ramonianus</i>
155	Blue-crowned Trogon	<i>Trogon curucui</i>
156	Collared Trogon	<i>Trogon collaris</i>
157	Masked Trogon	<i>Trogon personatus</i>
158	Rufous Motmot	<i>Baryphthengus martii</i>
159	Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>
160	Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>
161	Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>
162	White-necked Puffbird	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>
163	Western Striolated-Puffbird	<i>Nystalus obamai</i>
164	White-fronted Nunbird	<i>Monasa morphoeus</i>
165	Yellow-billed Nunbird	<i>Monasa flavirostris</i>
166	Bluish-fronted Jacamar	<i>Galbula cyanescens</i>
167	Scarlet-banded Barbet	<i>Capito wallacei</i>
168	Gilded Barbet	<i>Capito auratus</i>
169	Versicoloured Barbet	<i>Eubucco versicolor</i>
170	Southern Emerald-Toucanet	<i>Aulacorhynchus albivitta</i>
171	Chestnut-eared Aracari	<i>Pteroglossus castanotis</i>
172	Golden-collared Toucanet	<i>Selenidera reinwardtii</i>
173	Lafresnaye's Piculet	<i>Picumnus lafresnayi</i>
174	Ecuadorian Piculet	<i>Picumnus sclateri</i>

EN

EN

175	Speckle-chested Piculet	<i>Picumnus steindachneri</i>	EN
176	Yellow-tufted Woodpecker	<i>Melanerpes cruentatus</i>	
177	Little Woodpecker	<i>Veniliornis passerinus</i>	
178	Scarlet-backed Woodpecker	<i>Veniliornis callonotus</i>	
179	Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>	
180	Black-necked Woodpecker	<i>Colaptes atricollis</i>	EN
181	Spot-breasted Woodpecker	<i>Colaptes punctigula</i>	
182	Andean Flicker	<i>Colaptes rupicola</i>	
183	Crested Caracara	<i>Caracara plancus</i>	
184	Yellow-headed Caracara	<i>Daptrius chimachima</i>	
185	Mountain Caracara	<i>Daptrius megalopterus</i>	
186	American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	
187	Bat Falcon	<i>Falco rufigularis</i>	
188	Cobalt-winged Parakeet	<i>Brotogeris cyanopectera</i>	
189	Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>	
190	Riparian Parrotlet	<i>Forpus crassirostris</i>	
191	Pacific Parrotlet	<i>Forpus coelestis</i>	
192	Yellow-faced Parrotlet	<i>Forpus xanthops</i>	EN
193	Dusky-headed Parakeet	<i>Aratinga weddellii</i>	
194	Mitred Parakeet	<i>Psittacara mitratus</i>	
195	Red-masked Parakeet	<i>Psittacara erythrogenys</i>	
196	White-eyed Parakeet	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	
197	Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus</i>	
198	Rufous-capped Antshrike	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	
199	Chapman's Antshrike	<i>Thamnophilus zarumae</i>	
200	Lined Antshrike	<i>Thamnophilus tenuipunctatus</i>	
201	Collared Antshrike	<i>Thamnophilus bernardi</i>	
202	Marañon Antshrike	<i>Thamnophilus shumbae</i>	EN
203	Northern Slaty-Antshrike	<i>Thamnophilus punctatus</i>	
204	Rufescent Antshrike	<i>Thamnistes rufescens</i>	
205	Slaty Antwren	<i>Myrmotherula schisticolor</i>	
206	Yellow-breasted Antwren	<i>Herpsilochmus axillaris</i>	
207	Rusty-backed Antwren	<i>Formicivora rufa</i>	
208	Streak-headed Antbird	<i>Drymophila striaticeps</i>	
209	Peruvian Warbling-Antbird	<i>Hypocnemis peruviana</i>	
210	Spot-winged Antbird	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	
211	Chestnut-tailed Antbird	<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	
212	Cordillera Azul Antbird	<i>Myrmoderus eowilsoni</i>	EN
213	Marañon Crescentchest	<i>Melanopareia maranonica</i>	
214	Elegant Crescentchest	<i>Melanopareia elegans</i>	
215	Chestnut-crowned Antpitta	<i>Grallaria ruficapilla</i>	
216	Stripe-headed Antpitta	<i>Grallaria andicolus</i>	
217	Pale-billed Antpitta	<i>Grallaria carrikeri</i>	EN
218	Cajamarca Antpitta	<i>Grallaria cajamarcae</i>	EN
219	Chachapoyas Antpitta	<i>Grallaria gravesi</i>	EN

220	Leymebamba Antpitta	<i>Grallaricula leymebambae</i>	
221	Neblina Tapaculo	<i>Scytalopus altirostris</i>	EN
222	White-crowned Tapaculo	<i>Scytalopus atratus</i>	
223	Rufous-vented Tapaculo	<i>Scytalopus femoralis</i>	EN
224	Utcubamba Tapaculo	<i>Scytalopus intermedius</i>	EN
225	Short-tailed Antthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	
226	Coastal Miner	<i>Geositta peruviana</i>	EN
227	Olivaceous Woodcreeper	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	
228	Plain-brown Woodcreeper	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	
229	Wedge-billed Woodcreeper	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	
230	Strong-billed Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	
231	Ocellated Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	
232	Straight-billed Woodcreeper	<i>Dendroplex picus</i>	
233	Streak-headed Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	
234	Streaked Xenops	<i>Xenops rutilans</i>	
235	Point-tailed Palmcreeper	<i>Berlepschia rikeri</i>	
236	Pacific Hornero	<i>Furnarius cinnamomeus</i>	
237	Wren-like Rushbird	<i>Phleocryptes melanops</i>	
238	White-winged Cinclodes	<i>Cinclodes atacamensis</i>	
239	Rufous-rumped Foliage-gleaner	<i>Neophilydor erythrocerum</i>	
240	Rufous-tailed Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	
241	Rufous-necked Foliage-gleaner	<i>Syndactyla ruficollis</i>	
242	Henna-hooded Foliage-gleaner	<i>Clibanornis erythrocephalus</i>	
243	Ochre-throated Foliage-gleaner	<i>Automolus ochrolaemus</i>	
244	Pearled Treerunner	<i>Margarornis squamiger</i>	
245	Rufous-fronted Thornbird	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	
246	Chestnut-backed Thornbird	<i>Phacellodomus dorsalis</i>	EN
247	Many-striped Canastero	<i>Asthenes flammulata</i>	
248	Russet-mantled Softtail	<i>Cranioleuca berlepschi</i>	EN
249	Ash-browed Spinetail	<i>Cranioleuca curtata</i>	
250	Line-cheeked Spinetail	<i>Cranioleuca antisiensis</i>	
251	Great Spinetail	<i>Synallaxis hypochondriaca</i>	EN
252	Necklaced Spinetail	<i>Synallaxis stictothorax</i>	
253	Chinchipe Spinetail	<i>Synallaxis chinchipensis</i>	EN
254	Azara's Spinetail	<i>Synallaxis azarae</i>	
255	Rufous Spinetail	<i>Synallaxis unirufa</i>	
256	Yungas Manakin	<i>Chiroxiphia boliviana</i>	
257	Blue-rumped Manakin	<i>Lepidothrix isidorei</i>	
258	Painted Manakin	<i>Machaeropterus eckelberryi</i>	EN
259	Fiery-capped Manakin	<i>Machaeropterus pyrocephalus</i>	
260	Golden-headed Manakin	<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	
261	Green-and-black Fruiteater	<i>Pipreola riefferii</i>	
262	Scaled Fruiteater	<i>Ampelioides tschudii</i>	
263	Peruvian Plantcutter	<i>Phytotoma raimondii</i>	EN
264	Red-crested Cotinga	<i>Ampelion rubrocristatus</i>	

265	Andean Cock-of-the-rock	<i>Rupicola peruvianus</i>	
266	Grey-tailed Piha	<i>Snowornis subalaris</i>	
267	Masked Tityra	<i>Tityra semifasciata</i>	
268	Foothill Schiffornis	<i>Schiffornis aenea</i>	
269	Green-backed Becard	<i>Pachyramphus viridis</i>	
270	Barred Becard	<i>Pachyramphus versicolor</i>	
271	White-throated Spadebill	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	
272	Yellow-throated Spadebill	<i>Platyrinchus flavigularis</i>	
273	Many-coloured Rush Tyrant	<i>Tachuris rubrigastra</i>	
274	Streak-necked Flycatcher	<i>Mionectes striaticollis</i>	
275	Olive-striped Flycatcher	<i>Mionectes galbinus</i>	
276	Sepia-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	
277	Slaty-capped Flycatcher	<i>Leptopogon superciliaris</i>	
278	Marble-faced Bristle-Tyrant	<i>Pogonotriccus ophthalmicus</i>	
279	Mottle-cheeked Tyrannulet	<i>Phylloscartes ventralis</i>	
280	Rufous-headed Pygmy-Tyrant	<i>Pseudotriccus ruficeps</i>	
281	White-bellied Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis albiventris</i>	
282	Short-tailed Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis ecaudatus</i>	
283	Pearly-vented Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	
284	Buff-throated Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus rufigularis</i>	
285	Johnson's Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus luluae</i>	EN
286	Black-and-white Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus capitalis</i>	
287	Common Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum cinereum</i>	
288	Yellow-margined Flatbill	<i>Tolmomyias assimilis</i>	
289	Olive-faced Flatbill	<i>Tolmomyias viridiceps</i>	
290	Cinnamon Flycatcher	<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	
291	Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea ferruginea</i>	
292	Ornate Flycatcher	<i>Myiotriccus ornatus</i>	
293	White-lored Tyrannulet	<i>Ornithion inerme</i>	
294	Southern Beardless-Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum</i>	
295	White-tailed Tyrannulet	<i>Mecocerculus poecilocercus</i>	
296	White-banded Tyrannulet	<i>Mecocerculus stictopterus</i>	
297	Rufous-winged Tyrannulet	<i>Mecocerculus calopterus</i>	
298	Black-crested Tit-Tyrant	<i>Anairetes nigrocristatus</i>	
299	Tufted Tit-Tyrant	<i>Anairetes parulus</i>	
300	Tumbesian Tyrannulet	<i>Nesotriccus tumbezanus</i>	
301	Yellow-crowned Tyrannulet	<i>Tyrannulus elatus</i>	
302	Forest Elaenia	<i>Myiopagis gaimardii</i>	
303	Highland Elaenia	<i>Elaenia obscura</i>	
304	Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>	
305	Small-billed Elaenia	<i>Elaenia parvirostris</i>	
306	Lesser Elaenia	<i>Elaenia chiriquensis</i>	
307	Sierran Elaenia	<i>Elaenia pallatangae</i>	
308	Torrent Tyrannulet	<i>Serpophaga cinerea</i>	
309	Sooty-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	

310	Black-capped Tyrannulet	<i>Tyranniscus nigrocapillus</i>	
311	Ashy-headed Tyrannulet	<i>Tyranniscus cinereiceps</i>	
312	Tawny-rumped Tyrannulet	<i>Tyranniscus uropygialis</i>	
313	Mishana Tyrannulet	<i>Zimmerius villarejoi</i>	EN
314	Peruvian Tyrannulet	<i>Zimmerius viridiflavus</i>	
315	Fulvous-faced Scrub-Tyrant	<i>Euscarthmus fulviceps</i>	
316	Grey-and-white Tyrannulet	<i>Pseudelaenia leucospodia</i>	
317	Olive-chested Flycatcher	<i>Myiophobus cryptoxanthus</i>	
318	Mouse-grey Flycatcher	<i>Myiophobus crypterythrurus</i>	
319	Smoke-coloured Pewee	<i>Contopus fumigatus</i>	
320	Tumbes Pewee	<i>Contopus punensis</i>	
321	Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>	
322	Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	
323	Rufous-tailed Tyrant	<i>Knipolegus poecilurus</i>	
324	White-winged Black-Tyrant	<i>Knipolegus aterrimus</i>	
325	Black-billed Shrike-Tyrant	<i>Agriornis montanus</i>	
326	White-tailed Shrike-Tyrant	<i>Agriornis albicauda</i>	
327	Streak-throated Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes striaticollis</i>	
328	Crowned Chat-Tyrant	<i>Silvicultrix frontalis</i>	
329	Tumbes Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca salvini</i>	
330	Maroon-belted Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca thoracica</i>	
331	Rufous-breasted Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	
332	Piura Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca piurae</i>	EN
333	Long-tailed Tyrant	<i>Colonia colonus</i>	
334	Short-tailed Field Tyrant	<i>Muscigralla brevicauda</i>	
335	Rufous Flycatcher	<i>Myiarchus semirufus</i>	EN
336	Sooty-crowned Flycatcher	<i>Myiarchus phaeocephalus</i>	
337	Pale-edged Flycatcher	<i>Myiarchus cephalotes</i>	
338	Lesser Kiskadee	<i>Philohydor lictor</i>	
339	Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>	
340	Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua</i>	
341	Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis</i>	
342	Dusky-chested Flycatcher	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	
343	Baird's Flycatcher	<i>Myiodynastes bairdii</i>	
344	Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i>	
345	Crowned Slaty Flycatcher	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	
346	Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	
347	Ashy-headed Greenlet	<i>Hylophilus pectoralis</i>	
348	Lemon-chested Greenlet	<i>Hylophilus thoracicus</i>	
349	Dusky-capped Greenlet	<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	
350	Chivi Vireo	<i>Vireo chivi</i>	
351	White-collared Jay	<i>Cyanolyca viridicyanus</i>	
352	Green Jay	<i>Cyanocorax yncas</i>	
353	White-tailed Jay	<i>Cyanocorax mystacalis</i>	
354	Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>	

355	Tumbes Swallow	<i>Tachycineta stolzmanni</i>
356	Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>
357	Peruvian Martin	<i>Progne murphyi</i>
358	Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>
359	White-banded Swallow	<i>Atticora fasciata</i>
360	Blue-and-white Swallow	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>
361	Brown-bellied Swallow	<i>Orochelidon murina</i>
362	Chestnut-collared Swallow	<i>Petrochelidon rufocollaris</i>
363	Long-billed Gnatwren	<i>Ramphocaenus melanurus</i>
364	Marañón Gnatcatcher	<i>Poliophtila maior</i>
365	White-browed Gnatcatcher	<i>Poliophtila bilineata</i>
366	Scaly-breasted Wren	<i>Microcerculus marginatus</i>
367	Grey-mantled Wren	<i>Odontorchilus branickii</i>
368	Southern House Wren	<i>Troglodytes musculus</i>
369	Fasciated Wren	<i>Campylorhynchus fasciatus</i>
370	Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>
371	Superciliated Wren	<i>Cantorchilus superciliaris</i>
372	Bar-winged Wood-Wren	<i>Henicorhina leucoptera</i>
373	Grey-breasted Wood-Wren	<i>Henicorhina leucophrys</i>
374	White-capped Dipper	<i>Cinclus leucocephalus</i>
375	Long-tailed Mockingbird	<i>Mimus longicaudatus</i>
376	Andean Solitaire	<i>Myadestes ralloides</i>
377	Plumbeous-backed Thrush	<i>Turdus reevei</i>
378	Great Thrush	<i>Turdus fuscater</i>
379	Chiguanco Thrush	<i>Turdus chiguanco</i>
380	Black-billed Thrush	<i>Turdus ignobilis</i>
381	Marañón Thrush	<i>Turdus maranonicus</i>
382	Varzea Thrush	<i>Turdus sanchezorum</i>
383	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>
384	Golden-rumped Euphonia	<i>Chlorophonia cyanocephala</i>
385	Blue-naped Chlorophonia	<i>Chlorophonia cyanea</i>
386	Purple-throated Euphonia	<i>Euphonia chlorotica</i>
387	Golden-bellied Euphonia	<i>Euphonia chrysopasta</i>
388	Thick-billed Euphonia	<i>Euphonia laniirostris</i>
389	Orange-bellied Euphonia	<i>Euphonia xanthogaster</i>
390	Bronze-green Euphonia	<i>Euphonia mesochrysa</i>
391	Rufous-bellied Euphonia	<i>Euphonia rufiventris</i>
392	Lesser Goldfinch	<i>Spinus psaltria</i>
393	Hooded Siskin	<i>Spinus magellanicus</i>
394	Olivaceous Siskin	<i>Spinus olivaceus</i>
395	Ashy-throated Chlorospingus	<i>Chlorospingus canigularis</i>
396	Common Chlorospingus	<i>Chlorospingus flavopectus</i>
397	Tumbes Sparrow	<i>Rhynchospiza stolzmanni</i>
398	Yellow-browed Sparrow	<i>Ammodramus aurifrons</i>
399	Grey-browed Brushfinch	<i>Arremon assimilis</i>

400	Orange-billed Sparrow	<i>Arremon aurantirostris</i>	
401	Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	
402	White-headed Brushfinch	<i>Atlapetes albiceps</i>	
403	Yellow-breasted Brushfinch	<i>Atlapetes latinuchus</i>	
404	White-winged Brushfinch	<i>Atlapetes leucopterus</i>	
405	Peruvian Meadowlark	<i>Leistes bellicosus</i>	
406	Russet-backed Oropendola	<i>Psarocolius angustifrons</i>	
407	Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	
408	Yellow-rumped Cacique	<i>Cacicus cela</i>	
409	White-edged Oriole	<i>Icterus graceannae</i>	
410	Yellow-tailed Oriole	<i>Icterus mesomelas</i>	
411	Epaulet Oriole	<i>Icterus cayanensis</i>	
412	Orange-backed Troupial	<i>Icterus croconotus</i>	
413	Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	
414	Scrub Blackbird	<i>Dives warczewiczi</i>	
415	Oriole Blackbird	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	
416	Pale-eyed Blackbird	<i>Agelasticus xanthophthalmus</i>	
417	Black-lored Yellowthroat	<i>Geothlypis auricularis</i>	
418	Tropical Parula	<i>Setophaga pitiayumi</i>	
419	Three-banded Warbler	<i>Basileuterus trifasciatus</i>	
420	Black-crested Warbler	<i>Myiothlypis nigrocristata</i>	
421	Grey-and-gold Warbler	<i>Myiothlypis fraseri</i>	
422	Russet-crowned Warbler	<i>Myiothlypis coronata</i>	
423	Slate-throated Redstart	<i>Myioborus miniatus</i>	
424	Spectacled Redstart	<i>Myioborus melanocephalus</i>	
425	Hepatic Tanager	<i>Piranga flava</i>	
426	White-winged Tanager	<i>Piranga leucoptera</i>	
427	Yellow-lored Tanager	<i>Chlorothraupis frenata</i>	
428	Golden Grosbeak	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	
429	Red-capped Cardinal	<i>Paroaria gularis</i>	
430	Magpie Tanager	<i>Cissopis leverianus</i>	
431	White-capped Tanager	<i>Sericossypha albocristata</i>	
432	Rufous-crested Tanager	<i>Creurgops verticalis</i>	
433	Buff-bellied Tanager	<i>Thlypopsis inornata</i>	
434	Superciliaried Hemispingus	<i>Thlypopsis superciliaris</i>	
435	Rufous-chested Tanager	<i>Thlypopsis ornata</i>	
436	Plain-tailed Warbling Finch	<i>Microspingus alticola</i>	EN
437	Yellow-crested Tanager	<i>Loriotus rufiventer</i>	
438	White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>	
439	White-winged Shrike-Tanager	<i>Lanio versicolor</i>	
440	Black-bellied Tanager	<i>Ramphocelus melanogaster</i>	EN
441	Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	
442	Vermilion Tanager	<i>Calochaetes coccineus</i>	
443	Blue-capped Tanager	<i>Sporathraupis cyanocephala</i>	
444	Grass-green Tanager	<i>Chlorornis riefferii</i>	

445	Lacrimose Mountain Tanager	<i>Anisognathus lacrymosus</i>	
446	Scarlet-bellied Mountain Tanager	<i>Anisognathus igniventris</i>	
447	Blue-winged Mountain Tanager	<i>Anisognathus somptuosus</i>	
448	Yellow-throated Tanager	<i>Iridosornis analis</i>	
449	Blue-and-yellow Tanager	<i>Raueia bonariensis</i>	
450	Orange-eared Tanager	<i>Chlorochrysa calliparaea</i>	
451	Blue-grey Tanager	<i>Thraupis episcopus</i>	
452	Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	
453	Golden-naped Tanager	<i>Chalcothraupis ruficervix</i>	
454	Silvery Tanager	<i>Stilpnia viridicollis</i>	
455	Green-throated Tanager	<i>Stilpnia argyrofenges</i>	
456	Masked Tanager	<i>Stilpnia nigrocincta</i>	
457	Blue-necked Tanager	<i>Stilpnia cyanicollis</i>	
458	Blue-and-black Tanager	<i>Tangara vassorii</i>	
459	Beryl-spangled Tanager	<i>Tangara nigroviridis</i>	
460	Turquoise Tanager	<i>Tangara mexicana</i>	
461	Paradise Tanager	<i>Tangara chilensis</i>	
462	Bay-headed Tanager	<i>Tangara gyrola</i>	
463	Golden-eared Tanager	<i>Tangara chrysotis</i>	
464	Saffron-crowned Tanager	<i>Tangara xanthocephala</i>	
465	Flame-faced Tanager	<i>Tangara parzudakii</i>	
466	Green-and-gold Tanager	<i>Tangara schrankii</i>	
467	Golden Tanager	<i>Tangara arthus</i>	
468	Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>	
469	Black-faced Dacnis	<i>Dacnis lineata</i>	
470	Blue Dacnis	<i>Dacnis cayana</i>	
471	Purple Honeycreeper	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	
472	Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes spiza</i>	
473	Yellow-backed Tanager	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	
474	Blue-backed Conebill	<i>Conirostrum sitticolor</i>	
475	Cinereous Conebill	<i>Conirostrum cinereum</i>	
476	Moustached Flowerpiercer	<i>Diglossa mystacalis</i>	
477	Black-throated Flowerpiercer	<i>Diglossa brunneiventris</i>	
478	White-sided Flowerpiercer	<i>Diglossa albilatera</i>	
479	Rusty Flowerpiercer	<i>Diglossa sittoides</i>	
480	Deep-blue Flowerpiercer	<i>Diglossa glauca</i>	
481	Masked Flowerpiercer	<i>Diglossa cyanea</i>	
482	Ash-breasted Sierra Finch	<i>Geospizopsis plebejus</i>	
483	Cinereous Finch	<i>Piezorina cinerea</i>	EN
484	Grey-winged Inca-Finch	<i>Incaspiza ortizi</i>	EN
485	Buff-bridled Inca-Finch	<i>Incaspiza laeta</i>	EN
486	Little Inca-Finch	<i>Incaspiza watkinsi</i>	EN
487	Drab Hemispingus	<i>Pseudospingus xanthophthalmus</i>	
488	Collared Warbling Finch	<i>Poospiza hispaniolensis</i>	
489	Saffron Finch	<i>Sicalis flaveola</i>	

490	Sulphur-throated Finch	<i>Sicalis taczanowskii</i>
491	Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>
492	Parrot-billed Seedeater	<i>Sporophila peruviana</i>
493	Chestnut-throated Seedeater	<i>Sporophila telasco</i>
494	Drab Seedeater	<i>Sporophila simplex</i>
495	Chestnut-bellied Seed-Finch	<i>Sporophila angolensis</i>
496	Band-tailed Seedeater	<i>Catamenia analis</i>
497	Plain-coloured Seedeater	<i>Catamenia inornata</i>
498	Bananaquit	<i>Coereba flaveola</i>
499	Buff-throated Saltator	<i>Saltator maximus</i>
500	Streaked Saltator	<i>Saltator striatipectus</i>
501	Black-cowled Saltator	<i>Saltator nigriceps</i>
502	Golden-billed Saltator	<i>Saltator aurantiirostris</i>