

Perú

Marañón, Abra Patricia, Plataforma y Cajamarca

Agosto 2025



ICARO
BIRDING EXPERIENCE

Os presentamos un nuevo tour por el norte de Perú, realizado entre el 1 y el 15 de agosto, durante el cual exploramos una gran diversidad de paisajes: desde la región seca y cálida de la cuenca del río Marañón, hasta los frondosos bosques nubosos de las montañas de Abra Patricia y Alto Nieva, pasando por los alrededores del Parque Nacional de la Cordillera Azul y los parajes que rodean la localidad de Cajamarca. En total, estas zonas nos permitieron registrar **480 especies de aves**, entre ellas **32 endémicas** más 28 casi endémicas del Perú. De estas, destacan especialmente cuatro especies de gran relevancia por su distribución restringida y baja densidad poblacional: el *Long-whiskered Owlet*, uno de los búhos endémicos más pequeños del mundo, incluso más que nuestro gorrión común, el *Scarlet-banded Barbet*, descrita

para la ciencia en el año 2000 y con una distribución absolutamente pequeña, el *Marvelous Spatuletail*, quizás uno de los colibríes endémicos más bonitos del mundo y el *Cordillera Azul Antbird*, especie descrita para ciencia en el año 2020. Además, logramos observar hasta 5 especies de **tinamúes**, 59 especies de **colibríes**, 7 especies de **rapaces nocturnas**, 7 especies de **tucanes** y **tucanes de montaña**, así como 11 especies de **pájaros carpinteros**, entre muchas otras aves. Como es habitual en nuestros tours, al finalizar el viaje, cada participante eligió sus tres especies de aves favoritas. El resultado final situó al **Scarlet-banded Barbet** y al **Long-whiskered Owlet** empatados a puntos en el primer lugar, seguido por el **Marañón Crescentchest** en segundo lugar y finalmente, el **Cordillera Azul Antbird**, en tercer lugar.



Foto de grupo en Flor de Café / Plataforma tras ver los endémicos Scarlet-banded Barbet y Cordillera Azul Antbird ©Ferran López

Día 1 – Llegada a Chiclayo, pajareo por la costa y traslado al hotel

La mayoría de los participantes llegó al aeropuerto de Chiclayo por la mañana. Allí nos esperaban nuestro primer guía, Alex Durand, y el conductor, Horacio Ojeda, quienes nos recibieron con el minibús. Sin perder tiempo, iniciamos nuestra jornada de observación de aves en la costa de la localidad de Santa Rosa, donde nos esperaba un grupo de 12 **Peruvian Thick-knee** y nuestras primeras observaciones de **Gray-hooded Gull**, **Kelp Gull**, **West Peruvian Dove**, **Eared Dove**, **Peruvian Booby**, **Neotropic Cormorant**, **Snowy Egret**, **Brown Pelican** y **Long-tailed Mockingbird**. Luego, nos dirigimos hacia campos interiores situados a orillas del río Requena,

donde logramos registrar especies como **Cinnamon Teal**, **White-cheeked Pintail**, **Croaking Ground Dove**, **Groove-billed Ani** y un **Plumbeous Rail** que pudimos escuchar. También observamos **Black-necked Stilt**, varios **Killdeer**, **Collared Plover**, **Greater Yellowlegs**, **Baird's Sandpiper**, **Least Sandpiper**, **Semipalmated Sandpiper**, **Little Blue Heron**, **Great Egret**, **Harris's Hawk**, **Short-tailed Hawk**, **Burrowing Owl**, **Pacific Parrotlet**, el endémico **Coastal Miner**, **Pacific Hornero**, **Vermilion Flycatcher**, **Gray-breasted Martin**, **Peruvian Pipit**, **Peruvian Meadowlark**, **Shiny Cowbird** y **Drab Seedeater**, entre otras especies.



Peruvian Thick-knee por la costa de Santa Rosa ©Ferran López

Día 2 – Reserva Ecológica Chaparrí y Santuario Histórico Bosque de Pómac

Comenzamos el día muy temprano y, tras un buen desayuno, nos dirigimos a los distintos puntos de observación dentro de la Reserva Ecológica Chaparrí. Incluso desde el restaurante donde desayunamos, ya pudimos disfrutar de los primeros avistamientos: al menos dos **Lesser Nighthawk**, **Amazilia Hummingbird**, **Puna Ibis** y varias **Burrowing Owl**.

Poco después, ya inmersos en la zona semiseca de la reserva —caracterizada por un matorral espinoso típico del ecosistema

tumbesino—, continuamos con excelentes observaciones. En esta área registramos especies como **Short-tailed Woodstar**, **Tumbes Hummingbird**, **Necklaced Spinetail**, **Tumbesian Tyrannulet**, **Gray-and-white Tyrannulet**, los casi endémicos **Tumbes Chat-Tyrant**, **Plumbeous-backed Thrush**, **Tumbes Sparrow** y los endémicos **Rufous Flycatcher** y **Cinereous Finch**. También observamos **Collared Warbling Finch**, **White-browed Gnatcatcher**, **Bananaquit**, **Sulphur-throated Finch**, **Long-tailed Mockingbird**, **Peruvian Meadowlark**, entre otras especies destacadas.



Endémico Rufous Flycatcher en Chaparrí ©Ferran López

Continuamos nuestro recorrido en busca de otro importante endémico: el **White-winged Guan**, una especie clasificada como **En Peligro de Extinción** por la UICN, con una población estimada de apenas unos 200 individuos. Finalmente, logramos obtener muy buenas observaciones de dos

ejemplares de **White-winged Guan**, lo que marcó un momento destacado del recorrido. Además, sumamos nuevas especies para el tour, entre ellas: **Aplomado Falcon**, **Collared Antshrike**, **Elegant Crescentchest**, el casi endémico **Superciliated Wren**, también **White-edged**

Oriole, Scarlet-backed Woodpecker, Tropical Parula, Short-tailed Field Tyrant, Baird's Flycatcher, Tumbes Swallow, Saffron Finch, Parrot-billed Seedeater,

Golden Grosbeak, un solitario Andean Condor, junto con Black Vulture y Turkey Vulture, entre otras.



Endémico White-winged Guan en Chaparrí ©Ferran López

De camino al Bosque de Pómac, pudimos observar un **Savanna Hawk** sobrevolando nuestras cabezas. Una vez dentro del Santuario Histórico, nos encontramos con una verdadera explosión de actividad avifaunística. Al poco tiempo, logramos registrar otro de los endemismos más interesantes del viaje: el **Peruvian Plantcutter**, una especie clasificada como Vulnerable, que destaca por su inusual dieta basada casi exclusivamente en hojas.

Además, pudimos observar otras especies destacadas como **Peruvian Pygmy-Owl, Scarlet-backed Woodpecker, Southern Rough-winged Swallow, Fasciated Wren** y, una vez más, el endémico **Cinereous Finch**. Al final de la tarde, nos dirigimos a cenar y, tras completar nuestra lista diaria de especies observadas, nos retiramos a descansar, satisfechos con una jornada intensa y llena de grandes momentos.



Endémico Peruvian Plantcutter en el Bosque de Pómac ©Ferran López



Grupo pajareando y Burrowing Owl en el Bosque de Pómac ©Ferran López

Día 3 – Abra Porculla y Río Huancabamba


Comenzamos nuestra jornada muy temprano. Esta vez, teníamos planeado disfrutar del desayuno en plena naturaleza. Mientras nuestro conductor, Horacio, lo preparaba con todo detalle, comenzamos a observar nuestras primeras especies en uno de los tramos más elevados de las montañas de Porculla. Pudimos observar **Band-tailed Pigeon**, **Sparkling Violetear**, **Amazilia Hummingbird**, **Variable Hawk**, **Golden-olive Woodpecker**, **Elegant Crescentchest**, **Southern Beardless-Tyrannulet**, **Tumbesian Tyrannulet**, **Fulvous-faced Scrub-Tyrant**, **Southern House Wren**, **Fasciated Wren**, **Plumbeous-backed Thrush**, **Great Thrush**, **Chiguanco Thrush**, **Thick-billed Euphonia**, **Hooded Siskin**, las casi endémicas **White-winged Brushfinch** y **Bay-crowned Brushfinch**, también **Three-banded Warbler**, **Hepatic Tanager**, **Silvery**

Tanager, **Rusty Flowerpiercer** y **Ash-breasted Sierra Finch**, entre otras aves.

Un segundo punto, algo más elevado, nos brindó excelentes oportunidades de observación. Destacaron especies como el **Black-tailed Trainbearer** y el **Green-tailed Trainbearer**. Finalmente, logramos ver al **Peruvian Sheartail**, uno de los colibríes más emblemáticos de esta región. También observamos al **Purple-collared Woodstar**, **Little Woodstar**, **Harris's Hawk**, **Chapman's Antshrike** y **Rufous-necked Foliage-gleaner**. Poco después, apareció el primer endémico del día: el **Piura Chat-Tyrant**. A esta lista se sumaron otras especies notables como el **Rufous-browed Peppershrike** (solo escuchado), el casi endémico **Gray-and-gold Warbler**, **Slate-throated Redstart**, **Rufous-chested Tanager** y **Black-and-white Seedeater**.



Desayuno campero frente a las montañas de Abra Porculla ©Ferran López



El endémico Piura Chat-Tyrant y White-winged Brushfinch en Abra Porculla ©Ferran López

En otro pequeño tramo del recorrido, logramos encontrar al **Ecuadorian Piculet** y al casi endémico **Henna-hooded Foliage-gleaner**, una especie con una población muy reducida, clasificada como Vulnerable.

También observamos al **Line-cheeked Spinetail**, varios ejemplares de Tumbesian Tyrannulet —hasta tres individuos— y **Gray-breasted Martin**.

Comenzamos a descender por las montañas hasta llegar a la orilla del río Huancabamba, junto a unos arrozales, donde rápidamente notamos el cambio a un clima mucho más cálido. En esta zona, logramos observar nuestras primeras especies como **Great Kiskadee**, **Scrub Blackbird** y **Saffron Finch**. Un poco más adelante, recorrimos una pequeña pista entre matorrales secos, donde avistamos hasta tres ejemplares de **Peruvian Pygmy-Owl** y escuchamos al

Marañon Crescentchest. También tuvimos excelentes observaciones de **Pacific Hornero**, **Brown-crested Flycatcher**, **Green Jay**, **Yellow-tailed Oriole**, **Golden Grosbeak**, **Red-crested Finch**, **Dull-colored Grassquit** y **Streaked Saltator**, entre otras aves. Finalmente, ya llegando a nuestro alojamiento vimos por el río **Fasciated Tiger-Heron** y **Black Phoebe** para terminar la jornada.



Brown-crested Flycatcher y Peruvian Pygmy-Owl ©Ferran López

Día 4 – Reserva privada Uña de Gato

Como de costumbre, desayunamos temprano y, al poco tiempo, iniciamos el trayecto hacia la reserva privada de Uña de Gato. Una vez allí, caminamos por uno de los senderos, donde empezamos a observar especies como **Peruvian Pigeon**, **Ecuadorian Ground Dove** y **Blue Ground Dove**. También escuchamos a **Striped Cuckoo** y **Tataupa Tinamou**, y seguimos viendo grandes grupos de **Mitred Parakeet**, **Northern Slaty-Antshrike**, nuevamente **Marañon Crescentchest**, **Rufous-fronted**


Thornbird y al menos dos ejemplares de **Marañon Spinetail**, especie casi endémica, ya que mantiene una parte muy reducida de su población en una pequeña zona de Ecuador. Al cabo de poco, conseguimos observar uno de los endemismos más importantes de la región: el **Chinchipec Spinetail**. Además, registramos otras especies como **Yellow-bellied Elaenia**, **Bran-colored Flycatcher**, **Chivi Vireo**, **Speckle-breasted Wren**, **Drab Seed eater**, entre otras aves.



El endémico Chinchipe Spinetail en Uña de Gato ©Ferran López

Continuamos nuestra ruta haciendo una breve parada a orillas del río Marañón, donde las altas temperaturas se hacían notar. En este punto, logramos observar uno de los endemismos más importantes del tour: nuestro primer **Little Inca-Finch**, junto con otras especies como **Spot-throated Hummingbird**, **Black-chested Buzzard-Eagle**, **Fulvous-faced Scrub-Tyrant** y **Fasciated Wren**. Más adelante, desde el vehículo, observamos en unos arrozales a **Comb Duck**, **Black-necked Stilt**, **Puna Ibis** y **Great Egret**, además de otra **Fasciated Tiger-Heron** en el río.

Ya por la tarde, llegamos al Refugio del Colibrí Espátula, donde nos instalamos frente a los bebederos y comederos, preparando nuestras cámaras. En pocos minutos, logramos ver nuestro primer endémico **Marvelous Spatuletail** — finalmente fueron dos ejemplares—, junto con **Gray-chinned Hermit**, **Sparkling Violetear**, **Purple-collared Woodstar**, **Little Woodstar**, **Andean Emerald**, **White-bellied Hummingbird**, **Hepatic Tanager**, **Silver-beaked Tanager** y **Blue-gray Tanager**, entre otras aves.



Marvelous Spatuletail ©Jorge García, y Gray-chinned Hermit y Little Woodstar ©Ferran López

Día 5 – Cresta de San Lorenzo y Laguna de Pomacochas

El quinto día del tour amanecía, y la expectativa de subir a primera hora por la trocha de San Lorenzo —donde nos esperaban varias especies endémicas muy interesantes, como la **Pale-billed Antpitta**, quizá una de las antpittas más hermosas del mundo— nos tenía algo nerviosos. El esfuerzo que requiere el ascenso por el empinado sendero vale totalmente la pena. Sin embargo, nuestra subida fue lenta, ya que hacíamos paradas frecuentes para observar las distintas aves que iban apareciendo a lo largo del camino. Una de las primeras nuevas especies del día fueron tres ejemplares de **Andean Guan**, seguidos por **Amethyst-throated Sunangel**, **Rufous-capped Thornbill**, **Tyrian Metaltail**, **Collared Inca** y **Violet-throated Starfrontlet**. También apareció el siempre

espectacular **Sword-billed Hummingbird**. A lo lejos, escuchamos a **Gray-breasted Mountain-Toucan** y **Chestnut-crowned Antpitta**, y poco después se dejó ver la primera de un total de tres **Pale-billed Antpitta**, que pudimos observar a tan solo cuatro metros de distancia, para disfrute de todos los participantes.

Más adelante, también escuchamos al endémico **Utcubamba Tapaculo** y conseguimos ver **Buff-browed Foliage-gleaner**, **Pearled Treerunner**, hasta cuatro **Russet-mantled Softtail** —otra especie endémica con una distribución muy reducida—, así como **Azara's Spinetail**, **Rufous Spinetail**, al menos dos **Red-crested Cotinga**, **Barred Becard**, **Cinnamon Flycatcher**, **Sierran Elaenia**, **Rufous-breasted Chat-Tyrant** y **White-collared Jay**.



Endémica Pale-billed Antpitta en la Cresta de San Lorenzo ©Ferran López



Endémico Russet-mantled Softtail en la Cresta de San Lorenzo ©Ferran López



Grass-green Tanager y Barred Becard en la Cresta de San Lorenzo ©Ferran López

Agotados por la caminata, pudimos descansar mientras nos esperaba un buen almuerzo en uno de los restaurantes de la zona, desde donde logramos observar a **Chestnut-breasted Coronet, White-bellied Woodstar, Smoky-brown Woodpecker, Montane Woodcreeper, Smoke-colored Pewee, Rufous-browed Peppershrike y White-sided Flowerpiercer.** Pero nuestra

jornada aún no había terminado, así que decidimos hacer una visita a la laguna de Pomacochas, donde conseguimos ver **Common Gallinule, Striated Heron, Western Cattle Egret, Great Egret y Peruvian Meadowlark,** entre otras especies destacables. Finalmente, nos dirigimos hacia nuestro alojamiento en la Florida.

Día 6 – Abra Patricia – Alto Nieva, Owlet Lodge y alrededores

Iniciamos nuestro sexto día de tour visitando distintas áreas de Abra Patricia, prospeccionando varios tramos de carretera en busca de bandadas mixtas y otras especies interesantes. En uno de los primeros puntos apareció uno de los endemismos más destacados de la zona: el **Johnson's Tody-Flycatcher**, cuya distribución se limita a una pequeña región del norte del país.

Además, pudimos observar un par de grupos mixtos formados por **Blue-and-black**

Tanager, **Saffron-crowned Tanager**, **Flame-faced Tanager** y **Blue Dacnis**, junto con otras especies como **Bronzy Inca**, **Collared Inca**, **Southern Emerald-Toucanet** y **Olivaceous Siskin**. También escuchamos a **Streak-headed Antbird**, **Rufous-vented Tapaculo** y **Gray-breasted Wood-Wren**.

Un poco más adelante, observamos un **Roadside Hawk** posado, así como **Green Jay**, **Collared Inca**, **Crowned Chat-Tyrant**, y escuchamos a **Variable Antshrike**.



Roadside Hawk en Abra Patricia ©Ferran López

Otro tramo de carretera nos ofreció muy buenas observaciones de **Green-fronted Lancebill**, un esquivo y endémico **Rufous-vented Tapaculo**, una pareja de **Green-and-black Fruiteater**, **Pale-edged Flycatcher**, dos **Andean Solitaire**, **Blue-capped Tanager** y **Silvery Tanager**. Nos volvimos a detener en otro punto, donde a lo lejos pudimos ver

dos **Golden-headed Quetzal** y más **Band-tailed Pigeon**. Decidimos entonces dirigirnos a lo que sería nuestro próximo alojamiento, el Owlet Lodge. Una vez allí, nos entretuvimos frente a sus bebederos para colibríes, fotografiando a corta distancia **Lesser Violetear**, **Speckled Hummingbird**, **Long-tailed Sylph**, **Emerald-**

**bellied Puffleg, Bronzy Inca, Collared Inca,
Chestnut-breasted Coronet, Fawn-
breasted Brilliant, White-bellied**

**Woodstar, además de un casi endémico
Peruvian Tyrannulet.**



Emerald-bellied Puffleg en Owlet Lodge ©Ferran López



Arriba: Chestnut-breasted Coronet y Lesser Violetear; abajo. Long-tailed Sylph y Bronzy Inca en Owlet Lodge ©Ferran López

Tras nuestro almuerzo, realizamos un recorrido por uno de los senderos del alojamiento, observando **White-throated Quail-Dove**, **Masked Trogon**, nuevamente **Green-and-black Fruiteater**, **Peruvian Tyrannulet**, hasta tres **White-capped Tanager** y **Blue-and-black Tanager**. Además, escuchamos un **Hooded Tinamou** muy cercano, **Rusty-tinged Antpitta**, **Rufous Spinetail** y dos **Northern Chestnut-breasted Wren**.

Se hacía la tarde y llegaba el momento más esperado por todos: ir en busca del endémico **Long-whiskered Owlet**. Sin embargo, aún tuvimos tiempo de detenernos para mejorar nuestras observaciones del también endémico **Johnson's Tody-Flycatcher**, al que esta vez pudimos fotografiar con total comodidad.

Tras desplazarnos hasta el punto donde habita este pequeño búho —considerado uno de los endemismos más diminutos del

mundo, incluso más pequeño que nuestro gorrión común—, tuvimos que esperar a que anoheciera. Durante la espera, pudimos observar **Green Jay**, hasta siete **White-capped Tanager** y **Blue-winged Mountain Tanager**.

Una vez caída la noche, iniciamos la búsqueda. Al cabo de pocos minutos, escuchamos casi simultáneamente a dos **Long-whiskered Owlet**. Los nervios estaban a flor de piel, pero poco después uno de ellos se acercó hasta unos ocho metros, permitiéndonos iluminarlo con nuestro foco mientras permanecía inmóvil sobre una rama durante más de diez minutos. ¡Sin lugar a duda, fue una de las experiencias más emocionantes del tour!

Contentos y aún con la excitación del momento, regresamos al Owlet Lodge para cenar, repasar nuestra lista diaria e irnos a descansar.



El endémico Johnson's Tody-Flycatcher en Abra Patricia ©Ferran López



White-capped Tanager en Abra Patricia ©Ferran López



El endémico Long-whiskered Owlet en Abra Patricia ©Ferran López

Día 7 – Abra Patricia, Reserva Arena Blanca, arrozales de Nueva Cajamarca y Humedal de Indañe

Nos despertamos temprano y, partiendo desde nuestro alojamiento en Owllet Lodge, iniciamos el trayecto hacia la Reserva de Arena Blanca. A lo largo del camino hicimos varias paradas en diferentes puntos de la conocida trocha Royal Sunangel, con la esperanza de observar a este colibrí casi endémico. En nuestro primer punto de observación logramos ver **Chestnut-collared Swift**, **White-tipped Swift**, **Peruvian Racket-tail** y **White-bellied Woodstar**, además de escuchar nuevamente al **Gray-breasted Wood-Wren**. No fue sino hasta el segundo punto de observación que finalmente pudimos ver al menos dos ejemplares de **Royal Sunangel**. En este mismo sitio también observamos **Cinnamon-breasted Tody-Tyrant**, **Rufous-tailed Tyrant**, **Common Chlorospingus** y **Yellow-throated Tanager**, y escuchamos al **Scarlet-rumped Cacique** y **Speckled Chachalaca**.

Finalmente llegamos a la Reserva de Arena Blanca, donde ya nos estaban esperando para acceder directamente a los hides, desde los cuales pudimos observar tinamúes y otras especies. Una vez

instalados, logramos ver y fotografiar con tranquilidad a **Cinereous Tinamou**, **Little Tinamou**, **Rufous-breasted Wood-Quail** y **White-tipped Dove**.

Poco después, nos dirigimos a los espectaculares bebederos y comederos, donde tuvimos la oportunidad de observar hasta 16 especies de colibríes a muy corta distancia: **White-necked Jacobin**, **Rufous-breasted Hermit**, **Green Hermit**, **Great-billed Hermit**, **Sparkling Violetear**, **Brown Violetear**, **Black-throated Mango**, el espectacular **Wire-crested Thorntail**, **Rufous-crested Coquette**, **Black-throated Brilliant**, **Amethyst Woodstar**, **Violet-headed Hummingbird**, **Fork-tailed Woodnymph**, **Many-spotted Hummingbird**, **Golden-tailed Sapphire** y **Sapphire-spangled Emerald**.

En los alrededores también pudimos observar otras especies como **Swallow-tailed Kite**, **Fiery-capped Manakin**, **Peruvian Tyrannulet**, **Blue-naped Chlorophonia**, **Palm Tanager**, **Paradise Tanager**, **Yellow-bellied Dacnis**, **Blue Dacnis** y **Green Honeycreeper**, entre otras.



Cinereous Tinamou en Reserva Arena Blanca ©Ferran López




Little Tinaou y Rufous-breasted Wood-Quail en la Reserva Arena Blanca ©Ferran López



Wire-crested Thorntail en la Reserva Arena Blanca ©Ferran López

Tras el almuerzo —durante el cual logramos observar nuestro primer **House Sparrow** del viaje—, nos dirigimos a los arrozales de Nueva Cajamarca, donde el conjunto de especies cambió por completo. En esta zona pudimos observar **Smooth-billed Ani**, **Limpkin**, **Southern Lapwing**, **Black-necked Stilt**, **Wattled Jacana**, **Puna Ibis**, **Snowy Egret**, **Chestnut-bellied Seedeater**, **Blue Ground Dove**, **Short-tailed Swift**, **Fork-**

tailed Palm Swift, dos ejemplares de **Lafresnaye's Piculet**, **Little Woodpecker**, **Spot-breasted Woodpecker**, **Yellow-bellied Elaenia**, **Social Flycatcher**, **Sulphury Flycatcher**, **Orange-backed Troupial**, **White-lined Tanager**, el tan esperado endémico **Black-bellied Tanager** y **Chestnut-vented Conebill**, entre otras especies.



Lafresnaye's Piculet y Spot-breasted Woodpecker en los arrozales de la Nueva Cajamarca ©Ferran López

Continuamos recorriendo la zona de arrozales, donde seguimos registrando nuevas especies. Entre las aves observadas se encontraban **Striated Heron**, **Red-capped Cardinal**, **Blue-black Grassquit**, **Snail Kite**, **Ruddy Ground Dove**, **Purple Gallinule**, **Solitary Sandpiper**, **Great Yellow-headed Vulture**, **Plumbeous Kite**, **Black-fronted Nunbird**, **Yellow-headed Caracara**, hasta cinco ejemplares de **Dusky-headed Parakeet**, **Straight-billed Woodcreeper**,

Rufous-fronted Thornbird y un solitario **Black-billed Seed-Finch**. También logramos escuchar a **Barred Antshrike** y **White-throated Toucan**. A última hora de la tarde llegamos al pequeño humedal de Indañe con la esperanza de observar al **Masked Duck**, que lamentablemente no apareció. Sin embargo, pudimos ver alrededor de 20 **Brazilian Teal**, además de **Purple Gallinule** y un gran grupo de **White-collared Swift**. Finalmente, nos dirigimos a Moyobamba para cenar y alojarnos en nuestro hotel.

Día 8 – Cordillera Escalera y Laguna de Ricuricocha

Como era habitual, comenzamos la jornada tras un buen desayuno e iniciamos el ascenso a la Cordillera Escalera, ubicada a pocos kilómetros al este de Tarapoto.

Nuestro primer punto de observación fue el mirador Alto Ahuashiyacu, donde logramos ver varias especies de colibríes, destacando un **Black-bellied Thorntail**, además de

White-necked Jacobin, **Reddish Hermit**, **Fork-tailed Woodnymph** y **Golden-tailed Sapphire**. También registramos otras especies como **White-tipped Swift**, **Roadside Hawk**, **Cobalt-winged Parakeet**, **Purple-throated Euphonia**, **Thick-billed Euphonia**, nuestros primeros **Yellow-browed Sparrow** y la siempre vistosa **Paradise Tanager**, entre otras aves.



Grupo en el mirador de Alto Ahuashiyacu ©Ferran López

Continuamos varios kilómetros más adelante y realizamos una nueva parada en otro punto del camino, donde lo más destacado fue la observación de **Ochre-bellied Flycatcher**, **Olive-faced Flatbill** y **Green Honeycreeper**.

Tras otro tramo de carretera, llegamos a un nuevo sitio donde sumamos más especies a la lista del tour, incluyendo un nuevo colibrí: **Black-eared Fairy**. También observamos **White-lored Tyrannulet**, el esquivo **Dusky-chested Flycatcher** y **Rufous-bellied Euphonia**, entre otras aves.



White-lored Tyrannulet y Black-eared Fairy en Cordillera Escalera ©Ferran López

Durante una breve parada realizamos un llamado al **Golden-collared Toucanet**, y al poco tiempo apareció una pareja a muy corta distancia, para el deleite de todos los

presentes. En este mismo lugar también observamos un **Buff-throated Saltator** y otro ejemplar de **Roadside Hawk**.



Golden-collared Toucanet en Cordillera Escalera ©Ferran López

Continuamos descendiendo por la carretera hasta llegar a los restaurantes del complejo de cascadas de la zona, donde aprovechamos para almorzar mientras seguíamos observando aves. Desde allí pudimos ver **Swallow-tailed Kite**, **Russet-backed Oropendola**, **Yellow-rumped Cacique**, entre otras especies.

Tras la comida, regresamos al mirador para comprobar si algún grupo mixto se había acercado a la zona. Antes de llegar,

recorrimos a pie un pequeño tramo de carretera en el que observamos **Golden-tailed Sapphire**, **Bronze-green Euphonia**, **Black-faced Dacnis**, **Blue Dacnis**, hasta siete ejemplares de **Purple Honeycreeper**, **Chestnut-bellied Seed-Finch** y nuevamente **Buff-throated Saltator**.

Una vez en el mirador, solo logramos ver **White Hawk**, **Zone-tailed Hawk** y hasta cinco ejemplares de **Maroon-tailed Parakeet**.



White Hawk sobre el mirador de Alto Ahuashiyacu ©Ferran López

Decidimos descender de la Cordillera Escalera y aprovechar las últimas horas de la tarde pajareando en los alrededores de la laguna de Ricuricocha, donde muchas de las especies que esperábamos encontrar eran nuevas para todos nosotros. Durante el recorrido pudimos observar **Black-bellied Whistling-Duck**, **Brazilian Teal**, **Purple Gallinule**, **Wattled Jacana**, **Spotted Sandpiper**, **Little Blue Heron**, **Cocoi Heron**,

dos ejemplares de **Ringed Kingfisher**, **Amazon Kingfisher** y cinco **White-eyed Parakeet**. También escuchamos un **Pale-legged Hornero**, y observamos **Pearly-vented Tody-Tyrant**, **Mouse-colored Tyrannulet** y **Ashy-headed Greenlet**, entre otras especies. Finalmente, regresamos a nuestro alojamiento para cenar y descansar.



Grupo por los alrededores de la laguna de Ricuricocha ©Ferran López

Día 9 – Quebrada Upaquihoa y traslado a Flor de Café / Plataforma

Un nuevo día de tour que empezamos desplazándonos hacia la quebrada Upaquihoa. La seca vegetación de la zona ya nos hizo intuir que las especies de aves serían bastante diferentes. Un primer vistazo por la misma pista nos proporcionó buenas observaciones de **Speckled Chachalaca**, **Rufous-capped Nunlet**, hasta siete **Riparian Parrotlet**, **Barred Antshrike** y **Stripe-chested Antwren**. Tras un buen

desayuno en el campo, continuamos con más observaciones de al menos dos **Rusty-backed Antwren**, escuchamos **Straight-billed Woodcreeper** y **Tataupa Tinamou**, y más avistamientos de **Pearly-vented Tody-Tyrant**, **Common Tody-Flycatcher**, **Yellow-bellied Elaenia**, **Bran-colored Flycatcher**, **Green Jay**, **Buff-breasted Wren**, **Purple-throated Euphonia**, **White-lined Tanager** y **Dull-colored Grassquit**, entre otras aves.



Purple-throated Euphonia en Upaquihoa ©Ferran López

Ahora sí, empezamos el desplazamiento hacia la ciudad de Bellavista, donde dejaríamos nuestro minibús para subirnos a los coches 4x4 y poder realizar el trayecto de unas 4 horas hasta el pequeño pueblo de Flor de Café / Plataforma, al pie de la Cordillera Azul peruana. Por el inicio del trayecto cruzamos una amplia zona de arrozales donde pudimos observar nuestro primer **Hoatzin**, **Red-capped Cardinal**, varios limícolas como **Lesser Yellowlegs** o **Black-winged Stilt**.

Una vez en las partes más altas de las montañas pudimos observar **Squirrel Cuckoo**, **Rose-fronted Parakeet**, hasta cinco **Masked Tityra** y **Magpie Tanager**.

Finalmente, a última hora de la tarde llegamos a Flor de Café, donde pudimos dejar nuestras maletas e instalarnos. Poco antes de anochecer realizamos otra caminata que terminó ya de noche con una salida nocturna, donde pudimos ver un espectacular **Long-tailed Potoo**, **Foothill Screech-Owl**, **Masked Trogon**, **Gilded Barbet**, **Versicolored Barbet**, **Chestnut-tipped Toucanet**, **Black-tailed Leaf-tosser**, **Inambari Woodcreeper**, **Ochre-throated Foliage-gleaner**, **Yungas Manakin**, y por fin uno de los más bonitos frugívoros: el **Scarlet-breasted Fruiteater**, **Masked Tityra**, **Dusky-capped Flycatcher**, hasta cuatro **Paradise Tanager**, **Blue-necked Tanager**, **Bay-headed Tanager**, **Golden Tanager**, **Black-faced Dacnis**.

Además, pudimos escuchar **Black-banded Owl**, **Chestnut-crowned Gnateater**, **White-crowned Tapaculo**, **Short-tailed Antthrush**, **Olivaceous Woodcreeper** y un **Ringed Antpipit**.

Tras la exitosa salida nocturna regresamos a nuestro alojamiento, donde cenamos, hicimos la lista diaria en nuestra *checklist* y nos fuimos a dormir.



Long-tailed Potoo y Foothill Screech-Owl en Flor de Café/Plataforma ©Ferran López

Día 10 – Flor de Café / Plataforma

Despertamos temprano, conscientes de que esta era la mañana para intentar ver dos de las especies más importantes del tour. Por un lado, el **Scarlet-banded Barbet**, un endemismo peruano con una distribución extremadamente reducida en esta región, descrito para la ciencia en el año 2000; y por otro lado, el **Cordillera Azul Antbird**, otro endemismo descrito en 2018, también con una distribución muy restringida y que muy pocos observadores han logrado ver desde entonces. Así que nos subimos a nuestros vehículos 4x4 y, tras superar unas pistas muy embarradas por la lluvia de la noche anterior, conseguimos llegar a uno de los puntos clave para la primera especie mencionada.

Aquí pudimos observar: **Plumbeous Pigeon**, **Versicolored Barbet**, dos **Red-and-green Macaw**, **Blackish Antbird**, **Yungas Manakin**,

Sierran Elaenia, **Peruvian Tyrannulet**, **Streaked Flycatcher**, **Tropical Parula**, **Slate-throated Redstart**, **Golden Grosbeak**, **Magpie Tanager**, **Blue-winged Mountain Tanager**, **Golden-naped Tanager**, **Green-throated Tanager**, **Golden-collared Honeycreeper**, **Buff-throated Saltator**, y, por fin, un **Scarlet-banded Barbet** que se posó en uno de los árboles altos al margen del camino durante unos pocos minutos antes de desaparecer. Nos mantuvimos en ese mismo punto intentando que el individuo regresara, pero las esperanzas se fueron diluyendo poco a poco. Sin embargo, uno de nuestros guías logró relocalizar al **Scarlet-banded Barbet** a unos 400 metros de distancia, por una pequeña pista. En este nuevo lugar, las observaciones fueron mucho mejores y más cercanas, permitiéndonos verlo con claridad e incluso fotografiarlo.



Scarlet-banded Barbet en Flor de Café / Plataforma ©Ferran López

Tras el enorme subidón, ahora nos tocaba visitar otra zona para intentar observar al **Cordillera Azul Antbird**. Caminamos por una pista hasta llegar al área observando por el trayecto un gran grupo mixto, en el que logramos ver: **Napo Sabrewing**, **Collared Trogon**, **Yellow-breasted**

Antwren, **Streaked Xenops**, **Marble-faced Bristle-Tyrant**, **Long-tailed Tyrant**, **Social Flycatcher**, **Gray-mantled Wren**, **Thrush-like Wren**, **Blue-browed Tanager**, **Golden-eared Tanager**, **Green Honeycreeper**; y pudimos escuchar a **Yellow-rumped**

Cacique, Brown-capped Vireo y Lined Antshrike.

Finalmente, nos internamos en el bosque y, en completo silencio, iniciamos la espera utilizando el reclamo del **Cordillera Azul Antbird**. Al cabo de poco, respondió, y la tensión se podía cortar con un cuchillo.

Finalmente, como si de un ratón se tratara, apareció medio escondido, caminando entre la maleza. Así fue repitiendo su aparición en varias ocasiones, hasta que logramos fotografiarlo a corta distancia.

Además, también pudimos ver un **Yellow-throated Spadebill** muy confiado.



Cordillera Azul Antbird en Flor de Café / Plataforma ©Ferran López



Yellow-throated Spadebill en Flor de Café / Plataforma ©Ferran López

Todavía con la emoción de haber observado a estas dos increíbles especies en la misma mañana, decidimos ir a comer a nuestro alojamiento y descansar un rato antes de regresar a otra zona para pajarear el resto de la tarde y la noche.

En esta salida, pudimos observar: **White-fronted Nunbird**, hasta tres **Bluish-fronted Jacamar**, **Gilded Barbet**, **Versicolored Barbet**, dos **Chestnut-tipped Toucanet**, **Channel-billed Toucan**, **Lineated**

Woodpecker, tres **Blue-headed Parrot**, **Ocellated Woodcreeper**, una hembra de **Amazonian Umbrellabird**, **Masked Tityra**, dos **Buff-throated Saltator**; y también logramos escuchar a **Wing-barred Piprites**, **Short-tailed Antthrush**, **Scaled Antpitta**, **Red-necked Woodpecker** y, finalmente, a **Little Tinamou** y **Band-bellied Owl**.

Ya entrada la noche, regresamos a nuestro hotel para cenar y descansar después de un día tan intenso.



Grupo en acción en Flor de Café / Plataforma ©Ferran López

Día 11 – Regreso a Bellavista, Cañón Quiscarrumi y Waqanki

Comenzaba la jornada tras un buen desayuno, sabiendo que teníamos al menos 3 horas de trayecto por pista hasta llegar a Bellavista. Por el camino pudimos ir observando **Common Pauraque**, **Cobalt-winged Parakeet**, **Blue-headed Parrot**, **Chestnut-fronted Macaw**, una pareja de

Burrowing Owl, **Black-fronted Nunbird**, **Lineated Woodpecker**, **Violaceous Jay**, hasta tres **Chestnut-eared Aracari**, y también un **Perezoso de Tres Dedos**, que permanecía inmóvil sobre una rama de un árbol.

Una vez en las zonas de los arrozales, también pudimos disfrutar de dos **Fulvous Whistling-Duck**, **Comb Duck**, **Black-necked Stilt**, **Lesser** y **Greater Yellowlegs**, **Puna Ibis** y **Black-crowned Night Heron**.

En la población de Bellavista hicimos una especie de desayuno/almuerzo y nos

subimos a nuestro minibús para seguir con el trayecto, esta vez hacia Waqanki. Sin embargo, hicimos una breve parada para poder disfrutar de varias decenas de **Oilbirds** que revoloteaban en el cañón de Quiscarrumi.



Oilbirds en el Cañón de Quiscarrumi ©Ferran López

Finalmente llegamos al Lodge de Waqanki ya avanzada la tarde y nos fuimos directos hacia los bebederos de colibríes, donde empezó el festival con **White-necked Jacobin**, **Green Hermit**, **Great-billed Hermit**, **Black-throated Hermit**, **Sparkling Violetear**, **Brown Violetear**, **Black-throated Mango**, el espectacular **Rufous-crested Coquette**, **Long-billed Starthroat**, **Gray-breasted Sabrewing**, **Many-spotted Hummingbird**, **Golden-tailed Sapphire**,

Sapphire-spangled Emerald; además de **Cobalt-winged Parakeet**, **White-eyed Parakeet**, **Olivaceous Woodcreeper** y **Turquoise Tanager**, entre otras especies. Disfrutamos también con un pequeño grupo de **Red-mantled Saddle-back Tamarin**, una especie casi endémica de Tití.

Una vez anocheció, nos fuimos a cenar mientras se escuchaba un **Black-banded Owl**.



Red-mantled Saddle-back Tamarin en Waqanki Lodge ©Ferran López



Rufous-crested Coquette y Black-throated Mango en Waqanki Lodge ©Ferran López

Día 12 – Waqanki Lodge, Quebrada Mishquiyaquillo y desplazamiento hacia Leymebamba

Iniciamos el día desde *Waqanki Lodge*, donde parte del grupo permaneció fotografiando colibríes en los bebederos del mismo lodge, mientras que otra parte subió

por el sendero conocido como *Quebrada Mishquiyaquillo*. Durante este recorrido pudimos observar especies como **Speckled Chachalaca**, **Peruvian Pigeon**, **Smooth-billed Ani**, **Squirrel Cuckoo**, **White-collared**

Swift, Rufous Motmot, Broad-billed Motmot, White-fronted Nunbird, Lafresnaye's Piculet, White-throated Woodpecker, Cobalt-winged Parakeet, Blue-headed Parrot, Peruvian Warbling-Antbird, Olivaceous Woodcreeper, Plain-brown Woodcreeper, Golden-headed Manakin, White-winged Becard, Ochre-bellied Flycatcher, Sepia-capped Flycatcher, Slaty-capped Flycatcher, Sierran Elaenia, el endémico **Mishana Tyrannulet**, Euler's Flycatcher, Green Jay,

Varzea Thrush, Yellow-crested Tanager, Turquoise Tanager, Paradise Tanager, Crimson-breasted Finch y Slate-colored Grosbeak, entre otras aves.

Además, pudimos escuchar otras especies como Black-throated Hermit, Ferruginous Pygmy-Owl, Wing-barred Piprites, Black-and-white Tody-Flycatcher y Pale-breasted Thrush.



Foto de parte del grupo en la Quebrada Mishquiyaquillo ©Joan Gil

Nos tocaba entonces subirnos nuevamente a nuestro minibús para comenzar el trayecto hacia la pequeña y pintoresca población de *Leymebamba*. Sin embargo, realizamos un par de paradas durante el recorrido, a la orilla del río *Utcubamba*, donde logramos observar al endémico **Black-throated Woodpecker**, **Spot-**

throated Hummingbird y, una vez más, al **Marañón Crescentchest**, mejorando notablemente las observaciones previas.

Una vez en *Leymebamba*, fuimos a cenar, revisamos nuestra lista diaria de aves y nos dirigimos a descansar en nuestro hotel.



Black-throated Woodpecker en el río Utcubamba ©Ferran López



Marañon Crescentchest en el río Utcubamba ©Ferran López

Día 13 – Alrededores de Leymebamba, Río Marañón y Celendín

Apenas despertamos, nos dirigimos al museo de *Leymebamba*, donde recorrimos a pie un pequeño tramo de carretera. En este breve pero productivo recorrido, pudimos observar especies como **Black-tailed Trainbearer**, **Rainbow Starfrontlet**, **Sword-billed Hummingbird**, **White-bellied Hummingbird**, **Line-cheeked Spinetail**, **White-tailed Tyrannulet**, **Smoke-colored Pewee**, **Golden-rumped Euphonia**, **Yellow-breasted Brushfinch**, hasta tres individuos de **Black-crested Warbler**, **Silvery Tanager**, **Rusty Flowerpiercer** y pudimos escuchar a

lo lejos **Chestnut-crowned Antpitta**, entre otras especies.

Continuamos la ruta ascendiendo por las espectaculares montañas, que nos regalaron las primeras vistas de **Mountain Caracara** y varios **Andean Flicker**. Al llegar a las zonas más altas, exploramos nuevamente un pequeño tramo de carretera, donde logramos observar al endémico y esquivo **Utcubamba Tapaculo**, además de **Sierran Elaenia**, **Red-crested Cotinga** y escuchar nuevamente a la **Chestnut-crowned Antpitta**.



Red-crested Cotinga por las montañas de Leymebamba ©Ferran López

Continuamos varios kilómetros más adelante, hasta que comenzamos a divisar la impresionante cuenca del río *Marañón*. En este punto hicimos una nueva parada para observar especies como **Streaked Tuftedcheek**, **Yellow-breasted Brushfinch**, **Spectacled Redstart**, **Scarlet-bellied Mountain Tanager**, **Moustached Flowerpiercer**, **Masked Flowerpiercer** y

Plain-colored Seedeater. Además, escuchamos a muy corta distancia al endémico **Chachapoyas Antpitta**, aunque no logramos verlo. Poco más adelante, se nos cruzó un **Curve-billed Tinamou**, al que incluso pudimos fotografiar antes de que desapareciera entre la vegetación de la ladera de la montaña.



Yellow-breasted Brushfinch y Curve-billed Tinamou en las montañas de Leymebamba ©Ferran López

Pero nuestro trayecto continuaba entre paisajes impresionantes, y de tanto en tanto nos deteníamos para explorar nuevos tramos de la misma pista. En una de estas paradas, logramos observar a lo lejos un majestuoso **Andean Condor** y **Variable Hawk** y escuchar a un **White-chinned Thistletail**, y el endémico **Neblina Tapaculo** entre la vegetación.

Finalmente, llegamos al mirador Calla Calla, ubicado a una altitud de 3,600 m s. n. m., desde donde pudimos disfrutar de vistas espectaculares del paisaje andino. Además, observamos los endémicos **Coppery Metaltail** y **Neblina Tapaculo**, aparte de **Cream-winged Cinclodes**, **Many-striped Canastero**, **Brown-backed Chat-Tyrant** y **Plumbeous Sierra Finch**.



Grupo en el mirador Calla Calla ©Ferran López

A medida que fuimos descendiendo por la cuenca del *río Marañón*, la temperatura comenzó a elevarse y la vegetación fue cambiando notablemente. Hicimos una nueva parada para buscar al **Chestnut-backed Thornbird**, uno de los endemismos característicos de la zona, y que logramos localizar rápidamente gracias a la pericia de Alex. Poco después, apareció otro endémico, el **Gray-winged Inca-Finch**, y algunos kilómetros más adelante, sumamos dos especies endémicas adicionales: el **Buff-bridled Inca-Finch** y la **Marañón Gnatcatcher**.

Seguimos descendiendo cada vez más por la *Quebrada Seca Hornopampa*, en busca de más especies endémicas. Finalmente, logramos observar **Bare-faced Ground Dove**, **Long-tailed Mockingbird**, grandes grupos de **Mitred Parakeet**, así como **Vermilion Flycatcher**, **Green Jay**, **Spot-throated Hummingbird** y **Hepatic Tanager**, entre las especies más destacables del tramo.

Ya entrada la noche, llegamos a *Celendín*, donde cenamos y nos fuimos a descansar.



Chestnut-backed Thornbird y Buff-bridled Inca Finch en la Quebrada Seca Hornopampa ©Ferran López

Día 14 – Celendín, La Encañada, Puente Sangal y Cajamarca

Iniciábamos nuestro penúltimo día de tour al amanecer en *Celendín*, en la región de *Cajamarca*, con muchas ganas de pajarear en este tramo final del viaje. Nuestro trayecto hacia la ciudad de *Cajamarca* volvía a llevarnos por una zona montañosa, y en nuestro primer punto de observación logramos registrar **Andean Gull**, **Puna Ibis**, **Andean Flicker** y **American Kestrel**, todo esto mientras desayunábamos al aire libre, en el campo. Un poco más adelante, nos detuvimos en otro sitio donde conseguimos

ver varios endemismos importantes: **Tyrian Metaltail**, **Plain-tailed Warbling Finch**, y escuchamos muy cerca a la **Cajamarca Antpitta** y a la **Plumbeous Rail**. Además, pudimos observar otras especies destacadas como **Shining Sunbeam**, **Rainbow Starfrontlet**, **Great Sapphirewing**, **Puna Ibis**, **Line-cheeked Spinetail**, **Black-crested Tit-Tyrant**, **Tufted Tit-Tyrant**, **Black-crested Warbler**, **Spectacled Redstart**, **Buff-bellied Tanager**, **Cinereous Conebill** y **Plain-colored Seedeater**, entre otras aves.



El endémico Plain-tailed Warbling-Finch y Tufted Tit-Tyrant ©Ferran López

Pero nuestro trayecto continuaba, y seguimos por la misma carretera en dirección a *Cajamarca*. Como de costumbre, nos fuimos deteniendo cada vez que aparecía algún ave interesante, logrando observar especies como **Andean Lapwing**, **Andean Flicker**, **Slender-billed Miner**, **Mountain Caracara**, **Chiguanco Thrush**, **Rufous-webbed Bush-Tyrant** y varios **White-tailed Shrike-Tyrant**.

Más adelante, decidimos prospectar la zona de *La Encañada*, donde logramos registrar nuevamente **Tyrian Metaltail**, además de **Line-cheeked Spinetail**, **Yellow-breasted Brushfinch**, **Black-crested Warbler** y **Band-tailed Sierra Finch**.



Andean Flicker en Cajamarca ©Ferran López

Tras un buen almuerzo, decidimos aprovechar el resto de la tarde en busca de otro endemismo importante en el Puente Sangal: el **Gray-bellied Comet**, uno de los colibríes más icónicos de la región. Tuvimos éxito y logramos observar hasta dos individuos en diferentes puntos. Además, registramos otras especies interesantes

como **Bare-faced Ground Dove**, **Andean Swift**, hasta tres **Black-chested Buzzard-Eagle**, un **White-winged Cinclodes** en un tramo del río, así como más ejemplares de **Black-crested Tit-Tyrant** y **Black-throated Flowerpiercer**. Ya casi de noche decidimos ir a nuestro hotel para pasar la noche y descansar.



Gray-breasted Comet en Cajamarca Puente Sangal de Cajamarca ©Ferran López

Día 15 – Río Cajamarquino y alrededores y traslado al aeropuerto de Cajamarca

Iniciamos nuestro último día de tour visitando las zonas cercanas a la ciudad de Cajamarca, específicamente los alrededores del río Cajamarquino. Uno de los primeros puntos de observación fue elegido para buscar al **Great Spinetail**, uno de los últimos endemismos que podríamos encontrar durante el viaje. Al poco tiempo, conseguimos ver dos ejemplares junto a **White-winged Black-Tyrant**, **Peruvian**

Meadowlark, **Groove-billed Ani**, **Golden Grosbeak**, entre otras especies.

En un segundo punto de observación logramos registrar algunas especies nuevas para el viaje, como **Oasis Hummingbird**, **Spot-throated Hummingbird**, **Amazilia Hummingbird**, **Fulvous-faced Scrub-Tyrant**, **Hepatic Tanager**, **Green Jay**, nuevamente el endémico **Marañón Gnatcatcher**, y el llamativo **Buff-bridled Inca-Finch**.



Great Spinetail y Buff-bridled Inca-Finch en el Río Cajamarquino ©Ferran López

Finalmente, visitamos una pequeña zona al otro margen del río, donde pudimos observar **Purple-collared Woodstar**, dos **American Kestrel** y **Black-lored Yellowthroat**. Además, escuchamos a **Peruvian Pygmy-Owl** y **Shiny Cowbird**, entre otras especies.

Llegaba entonces el momento de dirigirnos hacia el aeropuerto de Cajamarca, donde daríamos por finalizado nuestro tour de quince días por el norte de Perú.

Lista total de aves detectadas

(EN) – Especie endémica

(cEN) – Casi endémica

Hooded Tinamou *Nothocercus nigrocapillus*

Cinereous Tinamou *Crypturellus cinereus*

Little Tinamou *Crypturellus soui*

Tataupa Tinamou *Crypturellus tataupa*

Curve-billed Tinamou *Nothoprocta curvirostris*

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis*

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*

Comb Duck *Sarkidiornis sylvicola*

Brazilian Teal *Amazonetta brasiliensis*

Cinnamon Teal *Spatula cyanoptera*

Speckled Chachalaca *Ortalis guttata*

Andean Guan *Penelope montagnii*

White-winged Guan *Penelope albipennis* EN

Rufous-breasted Wood-Quail *Odontophorus speciosus*

Rock Pigeon *Columba livia*

Band-tailed Pigeon *Patagioenas fasciata*

Peruvian Pigeon *Patagioenas oenops* cEN

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea*

Ruddy Ground Dove *Columbina talpacoti*

Ecuadorian Ground Dove *Columbina buckleyi*

Croaking Ground Dove *Columbina cruziana*

Blue Ground Dove *Claravis pretiosa*

Bare-faced Ground Dove *Metriopelia ceciliae*

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi*

White-throated Quail-Dove *Zentrygon frenata*

West Peruvian Dove *Zenaida meloda*

Eared Dove *Zenaida auriculata*

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*

Groove-billed Ani *Crotophaga sulcirostris*

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*

Lesser Nighthawk *Chordeiles acutipennis*

Rufous-bellied Nighthawk *Lurocalis rufiventris*

Common Pauraque *Nyctidromus albicollis*

Long-tailed Potoo *Nyctibius aethereus*

Oilbird *Steatornis caripensis*

Chestnut-collared Swift *Streptoprocne rutila*

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris*

Short-tailed Swift *Chaetura brachyura*

White-tipped Swift *Aeronautes montivagus*

Andean Swift *Aeronautes andecolus*

Fork-tailed Palm Swift *Tachornis squamata*

White-necked Jacobin *Florisuga mellivora*

Rufous-breasted Hermit *Glaucis hirsutus*

Green Hermit *Phaethornis guy*

Great-billed Hermit *Phaethornis malaris*

Black-throated Hermit *Phaethornis atrimentalis*

Gray-chinned Hermit *Phaethornis griseogularis*

Reddish Hermit *Phaethornis ruber*

Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae*

Sparkling Violetear *Colibri coruscans*

Brown Violetear *Colibri delphinae*

Lesser Violetear *Colibri cyanotus*

Black-eared Fairy *Heliothryx auritus*

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis*

Amethyst-throated Sunangel *Heliangelus amethysticollis*

Royal Sunangel *Heliangelus regalis* cEN

Wire-crested Thorntail *Discosura popelairii*

Black-bellied Thorntail *Discosura langsdorffi*

Rufous-crested Coquette *Lophornis delattrei*

Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys*

Long-tailed Sylph *Agelaiocercus kingii*
Gray-bellied Comet *Taphrolesbia griseiventris* **EN**
Black-tailed Trainbearer *Lesbia victoriae*
Green-tailed Trainbearer *Lesbia nuna*
Rufous-capped Thornbill *Chalcostigma ruficeps*
Tyrian Metaltail *Metallura tyrianthina*
Coppery Metaltail *Metallura theresiae* **EN**
Emerald-bellied Puffleg *Eriocnemis aline*
Marvelous Spatuletail *Loddigesia mirabilis* **EN**
Shining Sunbeam *Aglaeactis cupripennis*
Bronzy Inca *Coeligena coeligena*
Collared Inca *Coeligena torquata*
Violet-throated Starfrontlet *Coeligena violifer*
Rainbow Starfrontlet *Coeligena iris* **cEN**
Sword-billed Hummingbird *Ensifera ensifera*
Great Sapphirewing *Pterophanes cyanopterus*
Chestnut-breasted **Coronet** *Boissonneaua matthewsii*
Peruvian Racket-tail *Ocreatus peruanus*
Black-throated Brilliant *Heliodoxa schreibersii*
Fawn-breasted Brilliant *Heliodoxa rubinoides*
Long-billed Starthroat *Heliomaster longirostris*
Amethyst Woodstar *Calliphlox amethystine*
Peruvian Sheartail *Thaumastura cora* **cEN**
Short-tailed Woodstar *Myrmia micrura*
Purple-collared Woodstar *Myrtis fanny*
Oasis Hummingbird *Rhodopis vesper*
White-bellied Woodstar *Chaetocercus mulsant*
Little Woodstar *Chaetocercus bombus*
Violet-headed Hummingbird *Klais guimeti*
Gray-breasted Sabrewing *Campylopterus largipennis*
Napo Sabrewing *Campylopterus villaviscensio*
Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata*
Tumbes Hummingbird *Thaumasius baeri* **cEN**
Spot-throated **Hummingbird** *Thaumasius taczanowskii* **cEN**

Many-spotted **Hummingbird** *Taphrospilus hypostictus*
Amazilian Hummingbird *Amazilia amazilia*
Andean Emerald *Uranomitra franciae*
Golden-tailed Sapphire *Chrysuronia oenone*
Sapphire-spangled Emerald *Amazilia lactea*
White-bellied Hummingbird *Amazilia chionogaster*
Plumbeous Rail *Pardirallus sanguinolentus*
Common Gallinule *Gallinula galeata*
Purple Gallinule *Porphyrio martinica*
Limpkin *Aramus guarauna*
Peruvian Thick-knee *Hesperoburhinus superciliaris*
Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus*
Killdeer *Charadrius vociferus*
Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus*
Southern Lapwing *Vanellus chilensis*
Andean Lapwing *Vanellus resplendens*
Collared Plover *Anarhynchus collaris*
Wattled Jacana *Jacana jacana*
Spotted Sandpiper *Actitis macularius*
Solitary Sandpiper *Tringa solitaria*
Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*
Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca*
Baird's Sandpiper *Calidris bairdii*
Least Sandpiper *Calidris minutilla*
Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla*
Andean Gull *Chroicocephalus serranus*
Gray-hooded Gull *Chroicocephalus cirrocephalus*
Kelp Gull *Larus dominicanus*
Hoatzin *Opisthocomus hoazin*
Peruvian Booby *Sula variegata*
Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus*
Puna Ibis *Plegadis ridgwayi*
Fasciated Tiger-Heron *Tigrisoma fasciatum*
Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax*
Little Blue Heron *Egretta caerulea*

Snowy Egret *Egretta thula*

Striated Heron *Butorides striata*

Western Cattle-Egret *Bubulcus ibis*

Great Egret *Ardea alba*

Cocoi Heron *Ardea cocoi*

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis*

Andean Condor *Vultur gryphus*

Black Vulture *Coragyps atratus*

Turkey Vulture *Cathartes aura*

Greater Yellow-headed Vulture *Cathartes melambrotus*

Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*

Plumbeous Kite *Ictinia plumbea*

Snail Kite *Rostrhamus sociabilis*

Savanna Hawk *Buteogallus meridionalis*

Roadside Hawk *Rupornis magnirostris*

Harris's Hawk *Parabuteo unicinctus*

Variable Hawk *Geranoaetus polyosoma*

Black-chested Buzzard-Eagle *Geranoaetus melanoleucus*

White Hawk *Pseudastur albicollis*

Zone-tailed Hawk *Buteo albonotatus*

Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus*

Foothill Screech-Owl *Megascops roraimae*

Band-bellied Owl *Pulsatrix melanota*

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium brasilianum*

Peruvian Pygmy-Owl *Glaucidium peruanum*

Long-whiskered Owlet *Xenoglaux loweryi* **EN**

Burrowing Owl *Athene cunicularia*

Black-banded Owl *Strix huhula*

Golden-headed Quetzal *Pharomachrus auriceps*

Collared Trogon *Trogon collaris*

Masked Trogon *Trogon personatus*

Rufous Motmot *Baryphthengus martii*

Broad-billed Motmot *Electron platyrhynchum*

Ringed Kingfisher *Megaceryle torquata*

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona*

Rufous-capped Nunlet *Nonnula ruficapilla*

Black-fronted Nunbird *Monasa nigrifrons*

White-fronted Nunbird *Monasa morphoeus*

Bluish-fronted Jacamar *Galbula cyanescens*

Scarlet-banded Barbet *Capito wallacei* **EN**

Gilded Barbet *Capito auratus*

Versicolored Barbet *Eubucco versicolor*

Southern Emerald-Toucanet *Aulacorhynchus prasinus*

Chestnut-tipped Toucanet *Aulacorhynchus derbianus*

Gray-breasted Mountain-Toucan *Andigena hypoglauca*

Chestnut-eared Aracari *Pteroglossus castanotis*

Golden-collared Toucanet *Selenidera reinwardtii*

White-throated Toucan *Ramphastos tucanus*

Channel-billed Toucan *Ramphastos vitellinus*

Lafresnaye's Piculet *Picumnus lafresnayi*

Ecuadorian Piculet *Picumnus sclateri*

Smoky-brown Woodpecker *Leuconotopicus fumigatus*

Little Woodpecker *Veniliornis passerinus*

Scarlet-backed Woodpecker *Veniliornis callonotus*

Red-necked Woodpecker *Campephilus rubricollis*

Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus*

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus*

White-throated Woodpecker *Piculus leucolaemus*

Black-necked Woodpecker *Colaptes atricollis* **EN**

Spot-breasted Woodpecker *Colaptes punctigula*

Andean Flicker *Colaptes rupicola*

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima*

Mountain Caracara *Daptrius megalopterus*

American Kestrel *Falco sparverius*

Aplomado Falcon *Falco femoralis*

Cobalt-winged Parakeet *Brotogeris cyanopectera*

Blue-headed Parrot *Pionus menstruus*

Riparian Parrotlet *Forpus crassirostris*

Pacific Parrotlet *Forpus coelestis*

Rose-fronted Parakeet *Pyrrhura roseifrons*

Mitred Parakeet *Psittacara mitratus*

Maroon-tailed Parakeet *Pyrrhura melanura*

Dusky-headed Parakeet *Aratinga weddellii*

Chestnut-fronted Macaw *Ara severus*

Red-and-green Macaw *Ara chloropterus*

White-eyed Parakeet *Psittacara leucophthalmus*

Barred Antshrike *Thamnophilus doliatus*

Chapman's Antshrike *Thamnophilus zarumae* **cEN**

Lined Antshrike *Thamnophilus tenuepunctatus*

Collared Antshrike *Thamnophilus bernardi* **cEN**

Northern Slaty-Antshrike *Thamnophilus punctatus*

Variable Antshrike *Thamnophilus caerulescens*

Stripe-chested Antwren *Myrmotherula longicauda*

Yellow-breasted Antwren *Herpsilochmus axillaris*

Rusty-backed Antwren *Formicivora rufa*

Streak-headed Antbird *Drymophila striaticeps*

Peruvian Warbling-Antbird *Hypocnemis peruviana*

Blackish Antbird *Cercomacroides nigrescens*

Cordillera Azul Antbird *Myrmoderus eowilsoni* **EN**

Marañon Crescentchest *Melanopareia maranonica* **cEN**

Elegant Crescentchest *Melanopareia elegans*

Chestnut-crowned Gnateater *Conopophaga castaneiceps*

Scaled Antpitta *Grallaria guatimalensis*

Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla*

Pale-billed Antpitta *Grallaria carrikeri* **EN**

Rusty-tinged Antpitta *Grallaria przewalskii* **EN**

Cajamarca Antpitta *Grallaria cajamarcae* **EN**

Chachapoyas Antpitta *Grallaria gravesi* **EN**

Neblina Tapaculo *Scytalopus altirostris* **EN**

White-crowned Tapaculo *Scytalopus atratus*

Rufous-vented Tapaculo *Scytalopus femoralis* **EN**

Utcubamba Tapaculo *Scytalopus intermedius* **EN**

Short-tailed Antthrush *Chamaeza campanisona*

Black-tailed Leaftosser *Sclerurus caudacutus*

Coastal Miner *Geositta peruviana* **EN**

Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus*

Plain-brown Woodcreeper *Dendrocincla fuliginosa*

Ocellated Woodcreeper *Xiphorhynchus ocellatus*

Straight-billed Woodcreeper *Dendroplex picus*

Montane Woodcreeper *Lepidocolaptes lacrymiger*

Inambari Woodcreeper *Lepidocolaptes fatimalimae*

Streaked Xenops *Xenops rutilans*

Streaked Tuftedcheek *Pseudocolaptes boissonneautii*

Pacific Hornero *Furnarius cinnamomeus*

Pale-legged Hornero *Furnarius leucopus*

Cream-winged Cinclodes *Cinclodes albiventris*

White-winged Cinclodes *Cinclodes atacamanensis*

Buff-browed Foliage-gleaner *Syndactyla rufosuperciliata*

Rufous-necked Foliage-gleaner *Syndactyla ruficollis* **cEN**

Henna-hooded Foliage-gleaner *Clibanornis erythrocephalus*

Ochre-throated Foliage-gleaner *Automolus ochrolaemus*

Pearled Treerunner *Margarornis squamiger*

Rufous-fronted Thornbird *Phacellodomus rufifrons*

Chestnut-backed Thornbird *Phacellodomus dorsalis* **EN**

Many-striped Canastero *Asthenes flammulata*

White-chinned Thistletail *Asthenes fuliginosa*

Russet-mantled Softtail *Cranioleuca berlepschi* **EN**

Line-cheeked Spinetail *Cranioleuca antisiensis* **cEN**

Marañon Spinetail *Synallaxis maranonica* **cEN**

Great Spinetail *Synallaxis hypochondriaca* **EN**

Necklaced Spinetail *Synallaxis stictothorax*

Chinchi Spinetail *Synallaxis chinchipensis* **EN**

Azara's Spinetail *Synallaxis azarae*

Rufous Spinetail *Synallaxis unirufa*

Yungas Manakin *Chiroxiphia boliviana*

Fiery-capped Manakin *Machaeropterus Pyrocephalus*

Golden-headed Manakin *Ceratopira erythrocephala*

Green-and-black Fruiteater *Pipreola riefferii*

Scarlet-breasted Fruiteater *Pipreola frontalis*

Peruvian Plantcutter *Phytotoma raimondii* **EN**

Red-crested Cotinga *Ampelion rubrocristatus*

Amazonian Umbrellabird *Cephalopterus ornatus*

Masked Tityra *Tityra semifasciata*

Barred Becard *Pachyramphus versicolor*

White-winged Becard *Pachyramphus polychropterus*

Wing-barred Piprites *Piprites chloris*

Yellow-throated Spadebill *Platyrinchus flavigularis*

Ochre-bellied Flycatcher *Mionectes oleagineus*

Sepia-capped Flycatcher *Leptopogon amaurocephalus*

Slaty-capped Flycatcher *Leptopogon superciliaris*

Marble-faced Bristle-Tyrant *Pogonotriccus ophthalmicus*

Ringed Antpiper *Corythopsis torquatus*

Pearly-vented Tody-Tyrant *Hemitriccus margaritaceiventer*

Cinnamon-breasted Tody-Tyrant *Hemitriccus cinnamomeipectus* **cEN**

Johnson's Tody-Flycatcher *Poecilotriccus luluae* **EN**

Black-and-white Tody-Flycatcher *Poecilotriccus capitalis*

Common Tody-Flycatcher *Todirostrum cinereum*

Olive-faced Flatbill *Tolmomyias viridiceps*

Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias cinnamomeus*

White-lored Tyrannulet *Ornithion inermis*

Southern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma aboletum*

White-tailed Tyrannulet *Mecocerculus poecilocercus*

Black-crested Tit-Tyrant *Anairetes nigrocristatus* **cEN**

Yellow-billed Tit-Tyrant *Anairetes flavirostris*

Tufted Tit-Tyrant *Anairetes parulus*

Tumbesian Tyrannulet *Nesotriccus tumbezanus*

Mishana Tyrannulet *Zimmerius villarejoi* **EN**

Euler's Flycatcher *Lathrotriccus euleri*

Mouse-colored Tyrannulet *Nesotriccus murinus*

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster*

Sierran Elaenia *Elaenia pallatangae*

Peruvian Tyrannulet *Zimmerius viridiflavus* **cEN**

Fulvous-faced Scrub-Tyrant *Euscarthmus fulviceps*

Gray-and-white Tyrannulet *Pseudelaenia leucospodia*

Bran-colored Flycatcher *Myiophobus fasciatus*

Smoke-colored Pewee *Contopus fumigatus*

Black Phoebe *Sayornis nigricans*

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus obscurus*

Rufous-tailed Tyrant *Knipolegus poecilurus*

White-winged Black-Tyrant *Knipolegus aterrimus*

Rufous-webbed Bush-Tyrant *Cnemarchus rufipennis*

White-tailed Shrike-Tyrant *Agriornis albicauda*

Crowned Chat-Tyrant *Silvicultrix frontalis*

Tumbes Chat-Tyrant *Ochthoeca salvini* **cEN**

Rufous-breasted Chat-Tyrant *Ochthoeca rufipectoralis*

Brown-backed Chat-Tyrant *Ochthoeca fumicolor*

Piura Chat-Tyrant *Ochthoeca piurae* **EN**

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus*

Short-tailed Field Tyrant *Muscigralla brevicauda*

Rufous Flycatcher *Myiarchus semirufus* **cEN**

Dusky-capped Flycatcher *Myiarchus tuberculifer*

Pale-edged Flycatcher *Myiarchus cephalotes*

Brown-crested Flycatcher *Myiarchus tyrannulus*

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus*

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua*

Social Flycatcher *Myiozetetes similis*

Dusky-chested Flycatcher *Myiozetetes luteiventris*

Baird's Flycatcher *Myiodynastes bairdii*

Streaked Flycatcher *Myiodynastes maculatus*

Sulphur-bellied Flycatcher *Myiodynastes luteiventris*

Sulphury Flycatcher *Tyrannopsis sulphurea*

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus*

Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis*

Ashy-headed Greenlet *Hylophilus pectoralis*

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys*

Chivi Vireo *Vireo chivi*

White-collared Jay *Cyanolyca viridicyanus* **cEN**

Green Jay *Cyanocorax yncas*

Violaceous Jay *Cyanocorax violaceus*

Tumbes Swallow *Tachycineta stolzmanni* **cEN**

Gray-breasted Martin *Progne chalybea*

Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis*

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca*

Brown-bellied Swallow *Orochelidon murina*

Marañon Gnatcatcher *Polioptila maior* **EN**

White-browed Gnatcatcher *Polioptila bilineata*

Gray-mantled Wren *Odontorchilus branickii*

Southern House Wren *Troglodytes aedon*

Fasciated Wren *Campylorhynchus fasciatus*

Thrush-like Wren *Campylorhynchus turdinus*

Plain-tailed Wren *Pheugopedius euophrys*

Speckle-breasted Wren *Pheugopedius sclateri*

Superciliated Wren *Cantorchilus superciliaris*

Buff-breasted Wren *Cantorchilus leucotis*

Gray-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucophrys*

Northern Chestnut-breasted Wren *Cyphorhinus thoracicus*

Long-tailed Mockingbird *Mimus longicaudatus*

Andean Solitaire *Myadestes ralloides*

Plumbeous-backed Thrush *Turdus reevei*

Great Thrush *Turdus fuscater*

Chiguanco Thrush *Turdus chiguanco*

Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas*

Varzea Thrush *Turdus sanchezorum*

House Sparrow *Passer domesticus*

Peruvian Pipit *Anthus peruvianus* **EN**

Golden-rumped Euphonia *Chlorophonia cyanocephala*

Blue-naped Chlorophonia *Chlorophonia cyanea*

Purple-throated Euphonia *Euphonia chlorotica*

Golden-bellied Euphonia *Euphonia chrysopasta*

Thick-billed Euphonia *Euphonia lanirostris*

Orange-bellied Euphonia *Euphonia xanthogaster*

Bronze-green Euphonia *Euphonia mesochrysa*

Rufous-bellied Euphonia *Euphonia rufiventris*

Hooded Siskin *Spinus magellanicus*

Olivaceous Siskin *Spinus olivaceus*

Common Chlorospingus *Chlorospingus flavopectus*

Tumbes Sparrow *Rhynchospiza stolzmanni* **cEN**

Yellow-browed Sparrow *Ammodramus aurifrons*

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*

White-headed Brushfinch *Atlapetes albiceps* **cEN**

Yellow-breasted Brushfinch *Atlapetes latinuchus*

White-winged Brushfinch *Atlapetes leucopterus*

Bay-crowned Brushfinch *Atlapetes seebohmi* **cEN**

Peruvian Meadowlark *Leistes bellicosus*

Yellow-billed Cacique *Amblycercus holosericeus*

Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons*

Scarlet-rumped Cacique *Cacicus uropygialis*

Yellow-rumped Cacique *Cacicus cela*

Mountain Cacique *Cacicus chrysonotus*

White-edged Oriole *Icterus graceannae*

Yellow-tailed Oriole *Icterus mesomelas*

Orange-backed Troupial *Icterus croconotus*

Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis*

Scrub Blackbird *Dives waczewiczi*

Yellow-winged Blackbird *Agelasticus thilius*

Black-lored Yellowthroat *Geothlypis auricularis*

Tropical Parula *Setophaga pitayumi*

Three-banded Warbler *Basileuterus trifasciatus* **cEN**

Citrine Warbler *Myiothlypis luteoviridis*

Black-crested Warbler *Myiothlypis nigrocristata*

Gray-and-gold Warbler *Myiothlypis fraseri*

Slate-throated Redstart *Myioborus miniatus*

Spectacled Redstart *Myioborus melanocephalus*

Hepatic Tanager *Piranga hepatica*

Golden Grosbeak *Pheucticus chrysogaster*

Red-capped Cardinal *Paroaria gularis*

Magpie Tanager *Cissopis leverianus*

White-capped Tanager *Sericossypha albocristata*

Black-capped Hemispingus *Kleinotheraupis atropileus*

Buff-bellied Tanager *Thlypopsis inornata* **cEN**

Rufous-chested Tanager *Thlypopsis ornata*

Plain-tailed Warbling Finch *Microspingus alticola* **EN**

Yellow-crested Tanager *Loriotus rufiventer*

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus*

Black-bellied Tanager *Ramphocelus melanogaster* **EN**

Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo*

Hooded Mountain Tanager *Buthraupis montana*

Blue-capped Tanager *Sporathraupis cyanocephala*

Grass-green Tanager *Chlorornis riefferii*

Lacrimose Mountain Tanager *Anisognathus lacrymosus*

Scarlet-bellied Mountain Tanager *Anisognathus igniventris*

Blue-winged Mountain Tanager *Anisognathus somptuosus*

Yellow-throated Tanager *Iridosornis analis*

Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus*

Palm Tanager *Thraupis palmarum*

Golden-naped Tanager *Chalcothraupis ruficervix*

Silvery Tanager *Stilpnia viridicollis* **cEN**

Green-throated Tanager *Stilpnia argyrofenges*

Blue-necked Tanager *Stilpnia cyanicollis*

Blue-and-black Tanager *Tangara vassorii*

Blue-browed Tanager *Tangara cyanotis*

Turquoise Tanager *Tangara mexicana*

Paradise Tanager *Tangara chilensis*

Bay-headed Tanager *Tangara gyrola*

Golden-eared Tanager *Tangara chrysotis*

Saffron-crowned Tanager *Tangara xanthocephala*

Flame-faced Tanager *Tangara parzudakii*

Golden Tanager *Tangara arthus*

Black-faced Dacnis *Dacnis lineata*

Yellow-bellied Dacnis *Dacnis flaviventer*

Blue Dacnis *Dacnis cayana*

Purple Honeycreeper *Cyanerpes caeruleus*

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza*

Golden-collared Honeycreeper *Iridophanes pulcherrimus*

Chestnut-vented Conebill *Conirostrum speciosum*

Blue-backed Conebill *Conirostrum sitticolor*

Cinereous Conebill *Conirostrum cinereum*

Moustached Flowerpiercer *Diglossa mystacalis*

Black-throated Flowerpiercer *Diglossa brunneiventris*

White-sided Flowerpiercer *Diglossa albilatera*

Rusty Flowerpiercer *Diglossa sittoides*

Masked Flowerpiercer *Diglossa cyanea*

Plumbeous Sierra Finch *Geospizopsis unicolor*

Ash-breasted Sierra Finch *Geospizopsis plebejus*

Cinereous Finch *Piezorina cinerea* **EN**

Gray-winged Inca-Finch *Incaspiza ortizi* **EN**

Buff-bridled Inca-Finch *Incaspiza laeta* **EN**

Little Inca-Finch *Incaspiza watkinsi* **EN**

Band-tailed Sierra Finch *Rhopospina alaudina*

Drab Hemispingus *Pseudospingus xanthophthalmus* **cEN**

Collared Warbling Finch *Poospiza hispaniolensis*

Saffron Finch *Sicalis flaveola*

Sulphur-throated Finch *Sicalis taczanowskii* **cEN**

Blue-backed Grassquit *Volatinia jacarina*

Parrot-billed Seedeater *Sporophila peruviana*

Chestnut-throated Seedeater *Sporophila telasco*

Drab Seedeater *Sporophila simplex* **cEN**

Chestnut-bellied Seedeater *Sporophila castaneiventris*

Chestnut-bellied Seed-Finch *Sporophila angolensis*

Black-billed Seed-Finch *Sporophila atrirostris*

Black-and-white Seedeater *Sporophila luctuosa*

Plain-colored Seedeater *Catamenia inornate*

Red-crested Finch *Coryphospingus cucullatus*

Crimson-breasted Finch *Rhodospingus cruentus*

Bananaquit *Coereba flaveola*

Dull-colored Grassquit *Asemospiza obscura*

Buff-throated Saltator *Saltator maximus*

Streaked Saltator *Saltator striatipectus*

Slate-colored Grosbeak *Saltator grossus*