

# Países Bajos

Enero 2026



## Introducción

Entre los días 17 y 20 de enero regresamos a los Países Bajos para realizar uno de los tours más cortos, pero a la vez más intensos, con el objetivo de observar una buena parte de las especies de aves nórdicas. Supimos combinar, además, las rarezas que pudieran coincidir en estas fechas y que, por supuesto, suelen convertirse en un atractivo añadido del viaje. De este modo, logramos observar la mayoría de ánsares y barnaclas, incluyendo **barnacla cuelliroja**, **ánsar de Ross** y **ánsar chico**, así como las tres especies de **cisnes** y de **serretas**. También pudimos ver hasta tres individuos de **pato havelda**, una hembra de **porrón albeola**, **cormorán pigmeo**, hasta diez **pigargos europeos**,

**búho campestre**, un total de cinco machos de **gallo lira común** y decenas de **alondras cornudas** mezcladas con varios **pardillos piquigualdos**, entre otras especies. Una de las observaciones más valoradas por todos los participantes fue un macho de primer invierno de **escribano carinegro**, localizado en la isla de Texel.

Disfrutamos de la observación de miles de **barnaclas cariblancas** y **carinegras**, así como de **ánsares caretos**, además de centenares de **eíderes comunes** y **negrones comunes**, y de varios grupos de **focas grises**. Todo ello sin cambiar de alojamiento, siempre en el mismo hotel, evitando así el constante traslado de maletas.



Foto del grupo completo en la playa de Zuid-Holland ©Ferran López

## Día 1 – Llegada al aeropuerto de Schiphol y visita a la región de Flevoland

Conscientes de que en invierno los días son muy cortos en los Países Bajos, decidimos no perder tiempo y, nada más recoger nuestro vehículo, nos dirigimos hacia la cercana región de Flevoland. Al acceder al *polder* principal ya pudimos observar grandes concentraciones de **porrón moñudo**, junto con algunos **porrones bastardos**, **ánsares comunes** y **gansos del Nilo**. Un poco más adelante aparecieron también los primeros **porrones osculados**, así como **serreta chica**, **serreta mediana** y **serreta grande**.

Nos desplazamos entonces hasta uno de los puntos elevados de observación, donde poco a poco fuimos detectando varios ejemplares de **pigargo europeo** hasta alcanzar un total de diez individuos, además de **halcón peregrino** de la subespecie *calidus*, **aguilucho pálido**, nuestros primeros **cisnes cantores**, miles de **barnaclas cariblancas**, **silbón europeo**, **avefrías europeas**, más **serretas chicas** y **garceta grande**, entre otras especies



Barnaclitas cariblanca en Flevoland ©Ferran López

Nos desplazamos entonces hacia Lelystad para visitar su principal parque natural, donde sabíamos de antemano que era posible observar cormorán pigmeo. Recorrimos varios de los itinerarios que bordean algunas de sus lagunas principales sin éxito en ese objetivo, aunque sí pudimos disfrutar de otras especies como **picogordo común**, **trepador azul**, **arrendajo euroasiático**, **reyezuelo sencillo**, entre otras.

Finalmente, decidimos aprovechar los últimos momentos del día para rodear

otra de las lagunas y logramos localizar al **cormorán pigmeo**, que permanecía posado en la orilla. Además, aparecieron **pico picapinos** y **pico menor**.

Con la llegada del anochecer, nos dirigimos a nuestro alojamiento, situado al norte de Alkmaar, donde pudimos cenar con tranquilidad, repasar las aves observadas durante la primera jornada y retirarnos a descansar.



Cormorán pigmeo en Natuurpark Lelystad ©Ferran López



Grupo durante la cena ©Ferran López

## Día 2 – Zuid-Holland y marismas de Oudeland Van Strijen

Tras un buen desayuno tipo bufé libre, iniciamos nuestra segunda jornada desplazándonos hacia el sur para visitar buena parte de la costa, donde se concentran grandes números de aves marinas. Desde nuestro primer punto de observación en Brouwersdam ya pudimos ver pequeños grupos de **barnaclas carinegras** a corta distancia, así como **eíder común**, **serreta mediana**, **ostrero euroasiático**, **chorlito gris**, **zarapito real**, **archibebe común**, **vuelvepiedras común**, **gaviota cana**, **gaviota reidora**, **gaviota**

**argéntea europea**, **gavión atlántico**, al menos dos **zampullines cuellirrojos** y un **colimbo ártico**, entre otras especies.

Fuimos recorriendo distintos tramos de costa, observando detenidamente cada uno de sus rincones, hasta que finalmente dimos con dos **patos haveldas**. Además, pudimos observar **porrones osculados**, grupos de decenas de **negrones comunes**, más **eíderes comunes**, nuestros primeros **correlimos oscuros** y hasta cinco **colimbos chicos** juntos.

Prospectando el interior del wadi al Muaydin ©Ferran López



Arriba: barnacla carinegra, serreta mediana, gaviota argéntea europea y correlimos oscuro. Abajo foca gris en Zuid-Holland ©Ferran López

Al mediodía decidimos desplazarnos hacia el interior, al sur de la localidad de Goedereede, con el objetivo de buscar, en primer lugar, una **barnacla cuellirroja** que había sido observada recientemente y que pudimos ver al cabo de pocos minutos. Posteriormente nos dirigimos a los prados de Oudeland van Strijen con la intención de observar **ánsares chicos**. Esta región acoge con cierta regularidad a esta especie, por lo que decidimos invertir nuestras últimas horas del día en su búsqueda. Tras un rato

de espera, logramos observar al menos cuatro individuos entre miles de **barnaclas cariblancas**, **ánsares caretos** y **barnaclas canadienses**, entre otras especies. Cuando todo parecía llegar a su fin, apareció por sorpresa un **ánsar de Ross**, que pudimos disfrutar a cierta distancia. Con todos los objetivos cumplidos, iniciamos el trayecto de regreso hacia el norte para llegar a nuestro alojamiento y dar por concluida la jornada.



Barnacla cuellirroja en Goedereede ©Iván García



Ansar chico en Goedereede ©Ferran López



Buscando ánsares por los prados de Goedereede ©Iván García

### Día 3 – Isla de Texel y costa norte de Noord-Holland

Iniciamos nuestra tercera jornada del tour embarcando a primera hora en el ferry que nos llevó hasta la isla de Texel. Durante la travesía observamos varias **gaviotas canas**, **gaviotas argénteas europeas** y, como cita más destacada, un adulto de **gaviota tridáctila**. Tras desembarcar, nos dirigimos al faro situado en el extremo norte de la isla. Una vez en la zona, recorrimos a pie las dunas de la playa en busca de la alondra cornuda, aunque sin éxito. No obstante,

pudimos observar **barnacla carinegra**, **porrón moñudo**, **agachadiza común**, **somormujo lavanco** y **chochín paleártico**.

Posteriormente nos desplazamos a las marismas de Midden-Eierland, donde logramos ver alrededor de 15 **cisnes chicos** más cinco **cisnes cantores**, además de **tarro blanco**, **chorlitos dorados europeos**, **avefrías europeas** y **andarríos grande**, entre otras especies destacables.



Grupo de cisnes chicos en Midden-Eierland ©Ferran López

A continuación nos dirigimos hacia el impresionante estuario de De Slufter para realizar un segundo intento con las alondras cornudas. Sin embargo, en el camino nos

detuvimos para observar un grupo de alrededor de 50 **ánsares campestres de la tundra**.

Una vez en De Slufter, iniciamos el recorrido a pie hasta localizar un grupo de unas 45 **alondras cornudas**, mezcladas con varias decenas de **pardillos piquigualdos**. El espectáculo estaba servido: mientras se alimentaban en el prado, las aves se fueron acercando cada vez más, hasta situarse a unos 30–40 metros de distancia, ofreciéndonos imágenes realmente increíbles.

Además, a lo largo de los márgenes del estuario pudimos observar **ánade rabudo**, **cuchara común**, **silbón europeo**, **cerceta común**, **eider común**, **ostrero euroasiático**, **zarapito real**, **chorlito gris**, **aguja colinegra**, **alondra común**, **chocha perdiz**, varios **zorzales alirrojos** y **bisbitas costeros**.



Alondras cornudas junto a pardillos piquigualdos en De Slufter ©Ferran López

Sin embargo, aún nos quedaba pendiente uno de los pájaros “top” del viaje: el **escribano carinegro**. Un macho de primer invierno había sido detectado en los días previos al tour en el jardín de una vivienda particular, por lo que decidimos probar

suerte. Tras más de media hora de espera, apareció brevemente en el margen del seto perimetral de la casa, concediéndonos unos quince segundos de observación y la posibilidad de tomar algunas fotografías.



Escribano carinegro en Texel ©Ferran López

Para terminar el día, decidimos cruzar de nuevo en ferry hasta la costa de Noord-Holland, ya que recientemente se había localizado una **beluga** que se desplazaba a no demasiada distancia de la orilla y había sido observada por numerosas personas, llegando incluso a atraer a varios equipos de televisión para documentar el evento. Al

llegar al lugar nos informaron de que había sido vista tan solo unos 40 minutos antes, pero que finalmente se había perdido en dirección norte. Aguantamos un buen rato más antes de decidir retirarnos y dirigirnos a nuestro alojamiento para dar por concluida la jornada.

#### Día 4 – Parque Nacional de Sallandse Heuvelrug, Flevoland y puerto de Velsen-Zuid

Tras nuestro habitual desayuno, nos desplazamos hacia el interior del país con el objetivo de llegar lo antes posible al Parque Nacional de Sallandse Heuvelrug. Una vez en la zona, nos dispusimos a realizar una espera para localizar el *lek* de **gallo lira común**, pero justo al montar el telescopio logramos observar al menos dos machos

posados en la copa de uno de los pinos. Pudimos verlos con todo detalle e incluso obtener algunas fotografías. Al cabo de pocos minutos, la aparición de una hembra de azor común puso fin a la escena y los gallos desaparecieron. Más tarde, en otro punto cercano, conseguimos observar fugazmente a otros tres machos en vuelo.



Macho de gallo lira común en el PN de Sallandse Heuvelrug ©Ferran López

Nos desplazamos entonces de nuevo hacia la región de Flevoland para probar suerte con el **porrón albeola**, que no habíamos conseguido observar durante el primer día.

Nada más llegar, una hembra apareció a escasos metros del coche, ofreciéndonos excelentes oportunidades para fotografiar a esta preciada anátida americana.



Hembra de porrón albeola en Flevoland ©Ferran López

Nos desplazamos hasta el inicio del largo pólder de la carretera N307, junto a la localidad de Lelystad, donde habitualmente suelen concentrarse varios ejemplares de serretas. Nos detuvimos brevemente para observar un adulto de **gaviota del caspio**.


Una vez en el punto logramos observar **ánade friso, porrón europeo, serreta chica, serreta grande, serreta mediana** y **somormujo lavanco**, entre las especies más destacables.



Serreta chica y serreta grande en Lelystad ©Ferran López

Como parte final del tour, decidimos dirigirnos al puerto de Velsen-Zuid con la intención de observar un gavión hiperbóreo, aunque no tuvimos suerte. Sin embargo, durante el trayecto logramos ver un **búho campestre** posado sobre las

piedras de la orilla, incluso en Flevoland. Llegaba entonces el momento de desplazarnos al aeropuerto de Schiphol para despedirnos y dar por concluido este corto pero intenso tour por los Países Bajos.



Búho campestre en Lelystad ©Iván García

